

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイ 石灰硫黄合剤

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録品目「石灰硫黄合剤」が3月22日付けで、  
下記のように適用拡大登録されました。

商品名: サンケイ 石灰硫黄合剤

有効成分: 多硫化カルシウム……27.5%

登録番号: 農林水産省登録 第142号

(サンケイ化学㈱登録)

適用拡大登録月日: 2006年3月22日

### 拡大登録取得内容

作物名「果樹類: ハダニ類、サビダニ類」を追加。

作物名「うめ: 縮葉病」を追加。

作物名「すもも・あんず: ふくろみ病」を追加。

作物名「すぐり: うどんこ病」を追加。

落葉果樹に「越冬病害虫」を追加。

茶に「サビダニ類」を追加。

麦類の「さび病、うどんこ病」を50～60倍から40～140倍に変更。

りんごの「モニリア病、うどんこ病」を60～120倍から40～140倍に変更。

茶を100～200倍から夏期80～200倍、冬期20～40倍に変更。

桑の「カイガラムシ」を7倍から7～10倍に変更。

りんごの摘花として使用する場合、本剤の使用回数を「2回」、石灰硫黄合剤を含む農薬の総使用回数を「1」とする。

りんごのその他の使用方法では本剤の総使用回数を「1」、石灰硫黄合剤含む農薬の総使用回数を「1」とする。

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法						
作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
麦類	赤かび病	50～60倍	-			
	さび病	40～140倍				
	うどんこ病					
果樹類	ハダニ類	80～200倍	夏期			
	サビダニ類					
	ハダニ類	20～40倍	冬期			
	サビダニ類					
落葉果樹	カイガラムシ類	7～10倍	発芽前			
	ハダニ類					
	縮葉病					
	越冬病害虫					
なし	黒星病	7倍				
たらのき	胴枯病					
びゃくしん	赤星病	40倍	-			
りんご	腐らん病	10倍				
	モニリア病	40～140倍				
	うどんこ病					
もも	黒星病	7倍	発芽前	-	-	散布
	縮葉病					
	胴枯病					
うめ	縮葉病	8倍				
くり	芽枯病	20～40倍				
かき	黒星病	100倍				
	うどんこ病					
すもも	ふくろみ病	140倍	-			
あんず		80～140倍				
すぐり						
みかん	ハダニ類	80～200倍	冬期			
	そうか病					
	黒点病					
	かいよう病					
	ヤノネカイガラムシ	60～80倍 (硫化亜鉛加用)	-			
茶	ハダニ類	80～200倍	夏期			
	サビダニ類					
	ハダニ類	20～40倍	冬期			
	サビダニ類					
桑	カイガラムシ類	7～10倍	-			
	胴枯病	7倍				
りんご	(摘花)	100～120倍	満開後	2回		立木全面散布

使用回数(1): 本剤の使用回数

使用回数(2): 石灰硫黄合剤を含む農薬の総使用回数

サンケイ化学㈱営業企画部

TEL: 099 - 268 - 7588