

サンケイ化学 農薬登録情報

スピンドロン乳剤

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録品目「スピンドロン乳剤」が5月10日付けで、下記のように適用拡大登録されました。

商品名：^{サンケイ} スピンドロン乳剤

有効成分：マシ油……97.0%

登録番号：農林水産省登録 第12603号 (サンケイ化学㈱登録)

適用拡大登録月日：2006年5月10日

拡大登録取得内容

作物名「マンゴー」の適用病害虫名「ハダニ類」を追加。

「マシ油を含む農薬の総使用回数」および「本剤の使用回数」の欄を設け全作物の回数を「-」とする。

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法						
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
かんきつ	ヤブカイガラムシ幼虫	100～200倍	夏期6～10月	-	-	散布
	ミカンハダニ		春期4～6月			
	カイガラムシ類	60倍	冬期12～3月			
	ハダニ類	50倍				
りんご	ハダニ類	50倍	芽出し直前直後			
		100倍	展葉期(発芽後2週間まで)			
かき	フジコナカイガラムシ	50倍	発芽前	-	-	-
びわ	サンホーゼカイガラムシ	100倍	夏期8～9月			
なし	ハダニ類及びその越冬卵	50～100倍	休眠期			

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法						
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
茶	クワシロカイガラムシ	100～150倍	夏期5～9月	-	-	散布
		50～100倍	秋冬期10～3月			
	カンザワハダニ		秋冬期～春期発芽前または摘採直後			
桑	クワシロカイガラムシ若齢幼虫	50～60倍	夏期5～11月			
	クワシロカイガラムシ	30倍	冬期12～3月			
マンゴー	ハダニ類	100倍	収穫後から幼果期			

使用回数(1):本剤の使用回数

使用回数(2):マシン油を含む農薬の総使用回数

サンケイ化学㈱営業企画部

TEL:099-268-7588