

農薬登録情報

拡大登録取得のお知らせ

殺線虫剤 **テロン92** が4月27日付で適用拡大登録されました。

商品名 :サンケイテロン92

有効成分 :1,3-ジクロロペンチン・・・92.0%

登録番号 :農林水産省登録 第15168号

適用拡大登録年月日 :2005年4月27日

拡大登録取得内容

作物名「キャベツ」「まぐわうり」陸稲」を追加。ネグサレセンチュウ・ネコブセンチュウ コガネムシ類幼虫
 だいでの「ネグサレセンチュウ」「ネコブセンチュウ」を追加。
 たばこの「ネグサレセンチュウ」を追加。
 すぎ・ひのき(は種床)およびすぎ・ひのき(床替床)にネコブセンチュウを追加。
 ばれいしよに「ネコブセンチュウ」を追加。

以下に今回の適用拡大分のみ記載します。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数	使用方法	総使用回数
まぐわうり キャベツ 陸稲	ネグサレセンチュウ	15～20 ^{リットル} /10a (1穴 当り)1.5～ 2ml)	作付の10 ～15日前 まで	1回	1)全面処理 耕起整 地後、縦横30cm間 隔の畧盤の目に切り 千鳥状に深さ15～ 20cmに所定量の薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。 2)作条処理 :は種又 は植付前に予め予 定された溝に30cm 間隔に所定量を薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。	1回
	ネコブセンチュウ					
	ネグサレセンチュウ					
だいで	ネコブセンチュウ	20 ^{リットル} /10a (1穴当り) 2ml)	作付の10 ～15日前 まで	1回	1)全面処理 耕起整 地後、縦横30cm間 隔の畧盤の目に切り 千鳥状に深さ15～ 20cmに所定量の薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。 2)作条処理 :は種又 は植付前に予め予 定された溝に30cm 間隔に所定量を薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。	1回
	ネグサレセンチュウ					
すぎ・ひのき (播種床) すぎ・ひのき (床替床)	ネコブセンチュウ	15～20 ^{リットル} /10a (1穴 当り)1.5～ 2ml)	作付の10 ～15日前 まで	1回	1)全面処理 耕起整 地後、縦横30cm間 隔の畧盤の目に切り 千鳥状に深さ15～ 20cmに所定量の薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。 2)作条処理 :は種又 は植付前に予め予 定された溝に30cm 間隔に所定量を薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。	1回
	イシユクセンチュウ					
ばれいしよ	ネグサレセンチュウ	30～40 ^{リットル} /10a(1穴 当り)3～ 4ml)	作付の30 ～40日前 まで	1回	1)全面処理 耕起整 地後、縦横30cm間 隔の畧盤の目に切り 千鳥状に深さ15～ 20cmに所定量の薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。 2)作条処理 :は種又 は植付前に予め予 定された溝に30cm 間隔に所定量を薬 液を注入し直ちに覆 土鎮圧する。	1回
	ネコブセンチュウ					
	シヤカイモシトセンチュウ					
	青枯病 そうか病					
たばこ	ネグサレセンチュウ	4～6 ^{リットル} /10a (1穴 当り)3～ 4ml)	作付の30 ～40日前 まで	1回	全面処理(2) 植位置処理	1回
	ネコブセンチュウ					

全面処理(2) 耕起整地後、縦横30cm間隔の畧盤の目に切り千鳥状に深さ15～20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土し、ポリエチレンビニール等で被覆する。
 植位置処理 植付前、畦立、畦面被覆後に、植付予定位置の深さ15～20cmに所定量の薬液を注入し、直ちに覆土鎮圧する。但しガス抜きは行わないこと。