

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイアディオン乳剤

ペルメトリン乳剤

登録番号：農林水産省登録第 15960 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：ペルメトリン・・・20.0% 殺虫剤分類：3A

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイアディオン乳剤」は令和 6 年 5 月 29 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「だいず」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加する。
- ・作物名「とうもろこし」、「あずき」、「さといも」および「みずな」の希釈倍数「3000 倍」を「2000～3000 倍」に変更する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「ネキリムシ類」、使用方法「株元灌注」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「ネキリムシ類」、使用方法「株元灌注」を追加し、希釈倍数「3000 倍」を「2000～3000 倍」に変更する。
- ・作物名「もも」の適用病害虫名「ハマキムシ類」の希釈倍数「3000 倍」を「2000～3000 倍」に変更する。
- ・作物名「ネクタリン」の希釈倍数「2000～3000 倍」に適用病害虫名「ハマキムシ類」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- ・次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更】

- ・当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。
- ・ご使用の際は製品に貼付してあるラベルをご一読ください。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL：(099)268-7588

九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曽根崎町1154-3

TEL：(050)3508-7912

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL：(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数	
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメシンクイガ マメハンミョウ	3000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	アブラムシ類 カメムシ類 マメシンクイガ	24倍	0.8ℓ/10a			無人航空機による散布		
とうもろこし	アワノメイガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内	
	アブラムシ類	2000～3000倍						
あずき	アズキノメイガ	2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
	アブラムシ類	2000～3000倍						
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内	
	アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍						
みずな	アオムシ	2000倍		収穫前日まで	3回以内			3回以内
	アブラムシ類 ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	2000～3000倍						
ブロッコリー	コナガ	2000倍		収穫3日前まで		5回以内		5回以内
	アブラムシ類	2000～3000倍						
	ネキリムシ類	8000倍	0.5ℓ/㎡	株元灌注				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a		3回以内	散布	3回以内	
	アザミウマ類 ネギコガ	2000～3000倍						
	ネキリムシ類	4000～8000倍	0.5～1ℓ/㎡		株元灌注			
もも	カメムシ類	2000倍	200～700 ℓ/10a	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内	
	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍						
	ハマキムシ類	2000～3000倍						
	モモハモグリガ	2000～4000倍						
ネクタリン	カメムシ類	2000倍			3回以内			3回以内
	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類	2000～3000倍						
	モモハモグリガ	2000～4000倍						