サンケイ化学　農薬登録情報

キルパー

カーバムナトリウム塩液剤

登録番号：農林水産省登録第 24000 号（登録会社：ＺＭクロッププロテクション株式会社）
有効成分：カーバムナトリウム塩・・・・・・33.0%

殺虫剤分類：8F　殺菌剤分類：－　除草剤分類：－

毒　　性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
販売ｴﾘｱ　：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「キルパー」は令和８年３月４日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

・作物名「トマト、ミニトマト、いちご、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、すいか、メロン、かぼちゃ、なす、はくさい、ねぎ、わけぎ、あさつき、チンゲンサイ、みずな、レタス、非結球レタス、だいこん、キャベツ、ブロッコリー、にんじん、たまねぎ、にんにく、さやえんどう、実えんどう、ズッキーニ」、「ほうれんそう」、「かんしょ」及び「花き類・観葉植物」の使用目的に「前作のトマト又はミニトマトのすすかび病蔓延防止」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。

サンケイ化学株式会社

本　　社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL：(099)268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL：(03)3845-7951
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL：(06)6305-5871
東京営業部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL：(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曽根崎町1154-3	TEL：(050)3508-7912
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19　山本ビル	TEL：(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	使用目的	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩を含む農薬の総使用回数
トマト、ミニトマト、いちご、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、すいか、メロン、かぼちゃ、なす、はくさい、ねぎ、わけぎ、あさつき、チンゲンサイ、みずな、レタス、非結球レタス、だいこん、キャベツ、ブロッコリー、にんじん、たまねぎ、にんにく、さやえんどう、実えんどう、ズッキーニ	前作のトマト又はミニトマトのすすかび病蔓延防止	原液として40～60ℓ/10a	前作の栽培終了後から残渣撤去まで 但し、は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	1回
	前作の野菜類又は花き類・観葉植物の古株枯死					
	前作のいちごのネグサレセンチュウ蔓延防止	原液として60ℓ/10a			予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	
	前作のトマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類又はきゅうりのネコブセンチュウ蔓延防止					
	前作のトマト又はミニトマトのコナジラミ類蔓延防止	原液として40～60ℓ/10a				
	前作のトマトのハクサイダニ蔓延防止					
	前作のきゅうりのホモプシス根腐病蔓延防止	原液として60ℓ/10a				
	前作のきゅうりのコナジラミ類蔓延防止					
	前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類蔓延防止	原液として40～60ℓ/10a				
	前作のなすのフザリウム立枯病の蔓延防止	原液として60ℓ/10a			所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	
	前作のきゅうりの褐斑病の蔓延防止					
	前作のトルコギキョウの斑点病蔓延防止					
	前作のにんにくのイモグサレセンチュウ蔓延防止				所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し鎮圧又は被覆する。	
	前作のねぎの作物残渣に寄生したクロバネキノコバエ類蔓延防止	原液として40㎖/㎡	集積後からは種又は定植の15日前まで		ほ場内に集積した残渣物に所定量の薬液を散布し被覆する。	
	前作のきゅうりのつる枯病蔓延防止	原液として60ℓ/10a	前作の栽培終了後から残渣撤去まで 但し、は種又は定植の15日前まで		所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	

次ページへ続く

作物名	使用目的	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩を含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	前作のトマト又は ミニトマトの すすかび病蔓延防止	原液として 40～60ℓ/10a	前作の栽培終了後から残渣撤去まで 但し、は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	1回
	前作の野菜類又は 花き類・観葉植物の 古株枯死					
	前作のいちごの ネグサレセンチュウ 蔓延防止	原液として 60ℓ/10a			予め被覆した内で、 所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	
	前作のトマト、 ミニトマト、ピーマン、 とうがらし類又は きゅうりの ネコブセンチュウ蔓延防止					
	前作のトマト又は ミニトマトの コナジラミ類蔓延防止	原液として 40～60ℓ/10a				
	前作のトマトの ハクサイダニ蔓延防止					
	前作のきゅうりの ホモプシス根腐病蔓延防止	原液として 60ℓ/10a				
	前作のきゅうりの コナジラミ類蔓延防止					
	前作の野菜類又は 花き類・観葉植物の アザミウマ類蔓延防止	原液として 40～60ℓ/10a				
	前作のなすの フザリウム立枯病の蔓延防止	原液として 60ℓ/10a			所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	
	前作のきゅうりの 褐斑病の蔓延防止					
	前作のトルコギキョウの 斑点病蔓延防止					
	前作のにんにくの イモグサレセンチュウ蔓延防止				所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し鎮圧又は被覆する。	
	前作のねぎの作物残渣に寄生した クロバネキノコバエ類蔓延防止	原液として 40mℓ/㎡	集積後からは種又は定植の15日前まで		ほ場内に集積した残渣物に所定量の薬液を散布し被覆する。	
	前作のほうれんそうの ホウレンソウケナガコナダニ 蔓延防止	原液として 40～60ℓ/10a	前作の栽培終了後からは種の7日前まで		所定量の薬液を土壌表面に散布する。	
					所定量の薬液を土壌表面に散布し混和する。	
	前作のきゅうりの つる枯病蔓延防止	原液として 60ℓ/10a	前作の栽培終了後から残渣撤去まで 但し、は種又は定植の15日前まで		所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。	

次ページへ続く

<table>
<tr><th>作物名</th><th>使用目的</th><th>使用量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩を
含む農薬の
総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="22">かんしょ</td><td>前作のトマト又は
ミニトマトの
すすかび病蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
40～60ℓ/10a</td><td rowspan="20">前作の栽培終了
後から残渣撤去
まで
但し、は種又は
定植の15日前
まで</td><td rowspan="20">1回</td><td rowspan="2">所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布または
灌水する。</td><td rowspan="20">1回</td></tr>
<tr><td>前作の野菜類又は
花き類・観葉植物の
古株枯死</td></tr>
<tr><td>前作のいちごの
ネグサレセンチュウ
蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
60ℓ/10a</td><td rowspan="8">予め被覆した内で、
所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布または
灌水する。</td></tr>
<tr><td>前作のトマト、
ミニトマト、ピーマン、
とうがらし類又は
きゅうりの
ネコブセンチュウ蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のトマト又は
ミニトマトの
コナジラミ類蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
40～60ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>前作のトマトの
ハクサイダニ蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
ホモプシス根腐病蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
60ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
コナジラミ類蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作の野菜類又は
花き類・観葉植物の
アザミウマ類蔓延防止</td><td>原液として
40～60ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>前作のなすの
フザリウム立枯病の蔓延防止</td><td rowspan="5">原液として
60ℓ/10a</td><td rowspan="3">所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布または
灌水する。</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
褐斑病の蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のトルコギキョウの
斑点病蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のにんにくの
イモグサレセンチュウ蔓延防止</td><td>所定量の薬液を土壌表面に
散布し、直ちに混和し
鎮圧又は被覆する。</td></tr>
<tr><td>前作のねぎの作物残渣に寄生した
クロバネキノコバエ類蔓延防止</td><td>原液として
40mℓ/㎡</td><td>集積後からは種
又は定植の
15日前まで</td><td>ほ場内に集積した残渣物に
所定量の薬液を散布し
被覆する。</td></tr>
<tr><td>次作の基腐病の発病抑制</td><td rowspan="2">原液として
60ℓ/10a</td><td>前作の栽培終了
後から植付の
15日前まで</td><td>前作の作物残渣を含む
土壌表面に所定量の薬液を
散布し、直ちに混和し
鎮圧又は被覆する。</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
つる枯病蔓延防止</td><td>前作の栽培終了
後から残渣撤去
まで
但し、は種又は
定植の15日前
まで</td><td>所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布
または灌水する。</td></tr>
</table>

次ページへ続く

<table>
<tr><th>作物名</th><th>使用目的</th><th>使用量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩を
含む農薬の
総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="19">花き類・観葉植物</td><td>前作のトマト又は
ミニトマトの
すすかび病蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
40～60ℓ/10a</td><td rowspan="17">前作の栽培終了
後から残渣撤去
まで
但し、は種又は
定植の15日前
まで</td><td rowspan="19">1回</td><td rowspan="2">所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布または
灌水する。</td><td rowspan="19">1回</td></tr>
<tr><td>前作の野菜類又は
花き類・観葉植物の
古株枯死</td></tr>
<tr><td>前作のいちごの
ネグサレセンチュウ
蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
60ℓ/10a</td><td rowspan="9">予め被覆した内で、
所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布または
灌水する。</td></tr>
<tr><td>前作のトマト、
ミニトマト、ピーマン、
とうがらし類又は
きゅうりの
ネコブセンチュウ蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のトマト又は
ミニトマトの
コナジラミ類蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
40～60ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>前作のトマトの
ハクサイダニ蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
ホモプシス根腐病蔓延防止</td><td rowspan="2">原液として
60ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
コナジラミ類蔓延防止</td></tr>
<tr><td rowspan="2">前作の野菜類又は
花き類・観葉植物の
アザミウマ類蔓延防止</td><td>原液として
40～60ℓ/10a</td></tr>
<tr><td rowspan="5">原液として
60ℓ/10a</td><td rowspan="5">所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布または
灌水する。</td></tr>
<tr><td>前作のなすの
フザリウム立枯病の蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
褐斑病の蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のトルコギキョウの
斑点病蔓延防止</td></tr>
<tr><td>前作のにんにくの
イモグサレセンチュウ蔓延防止</td><td>所定量の薬液を土壌表面に
散布し、直ちに混和し
鎮圧又は被覆する。</td></tr>
<tr><td>前作のねぎの作物残渣に寄生した
クロバネキノコバエ類蔓延防止</td><td>原液として
40mℓ/㎡</td><td>集積後からは種
又は定植の
15日前まで</td><td>ほ場内に集積した残渣物に
所定量の薬液を散布し
被覆する。</td></tr>
<tr><td>前作のきゅうりの
つる枯病蔓延防止</td><td>原液として
60ℓ/10a</td><td>前作の栽培終了
後から残渣撤去
まで
但し、は種又は
定植の15日前
まで</td><td>所定量の薬液を水で希釈し
土壌表面に散布
または灌水する。</td></tr>
</table>