サンケイ化学　農薬登録情報

キルパー40

カーバムナトリウム塩液剤

登録番号：農林水産省登録第 24080 号（登録会社：ZM クロッププロテクション株式会社）
有効成分：ナトリウム=メチルジチオカルバマート・・・・・・42.0%　殺虫剤分類：8F
毒　　性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
販売ｴﾘｱ　：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「キルパー40」は令和８年２月４日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名作物名「もも(伐倒木)、もも(枯損木)、うめ(伐倒木)、うめ(枯損木)、すもも(伐倒木)、すもも(枯損木)」を「核果類(伐倒木)、核果類(枯損木)」に変更する。
- 作物名「樹木類」、適用病害虫「南根腐病」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸期間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カーバムナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
核果類(伐倒木) 核果類（枯損木） さくら(伐倒木) さくら(枯損木)	ー	クビアカツヤカミキリ	被覆内容積1㎥当り原液750～1500㎖	14日間以上	成虫羽化脱出前	1回	加害された伐倒木を集積したものまたは枯損木に、所定薬量を散布し、直ちにビニールシート等で密閉し所定期間くん蒸する。	1回
樹木類	被害跡地	南根腐病	1㎥当り原液550㎖	21日間以上	定植前		1㎥当り20ヶ所に深さ30㎝の孔をあけ、所定薬量を注入後、直ちにビニールシート等で密閉し所定期間くん蒸する。	

【使用上の注意事項の変更等】

以下の文言を追加する。

〇南根腐病を対象にくん蒸する場合は、次のことを守ること。

①行政機関等（県、市町村）から南根腐病の発生地域として指定された防除を必要とする場所での使用に限る。また、安全管理及び使用方法については、沖縄県の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮する。

②被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに処理区を取り、1 ㎡当り 20 ヶ所に深さ 30cm の孔を開け、所定薬量を注入後、直ちにビニールシート等で被覆する。

③21 日間以上くん蒸後に被覆を除去して十分ガス抜き耕起し、植え付ける。

【安全使用上の注意事項の変更等】

以下の文言を変更する。

〇処理の際は吸収缶（活性炭入り）付き防護マスク、保護眼鏡、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴などを着用すること。なお、処理後のシート除去の際にも吸収缶（活性炭入り）付き防護マスクを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。

サンケイ化学株式会社

本　　社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL：(099)268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL：(03)3845-7951
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL：(06)6305-5871
東京営業部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL：(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曽根崎町1154-3	TEL：(050)3508-7912
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19　山本ビル	TEL：(0985)25-7051