

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイダブルシューターSE

脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤

登録番号：農林水産省登録第 24054 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：脂肪酸グリセリド・・・・・・・・75.0%

スピノサド・・・・・・・・5.0%

殺虫剤分類：一、5

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイダブルシューターSE」は令和8年5月27日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「はくさい」、「たまねぎ」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「ヨトウムシ」を追加する。
- ・作物名「鱗茎類（にら、にら(花茎)を除く)」を「鱗茎類（たまねぎ、にら(花茎)を除く）」に変更する。
- ・作物名「アスパラガス」の使用液量「100～300ℓ/10a」を「100～500ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「アスパラガス」の適用病害虫名「アザミウマ類」に使用方法「常温煙霧」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数
はくさい	ヨトウムシ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	—	4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)
キャベツ	アザミウマ類 ヨトウムシ							4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)
鱗茎類 (たまねぎ、 にら(花茎)を除く)	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ネギハモグリバエ							3回以内
たまねぎ		10倍	2ℓ/10a			無人航空機 による散布		
アスパラガス	ハダニ類 アザミウマ類	1000倍	100～500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布		2回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数
アスパラガス	温室、ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる場所	アザミウマ類	250ml /10a	10ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	常温煙霧	—	2回以内

【使用上の注意事項の変更等】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

以下のとおり、追加・変更する。

○本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。

- 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施すること。
- 散布に当たっては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- 特定の農薬（混用可能が確認されているもの）を除いて原則として他の農薬との混用は行わないこと。
- 作業終了後は次の項目を守ること。
 - a.使用後の空の容器は放置せず、適切に処理すること。
 - b.機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。

○ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。

- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないこと。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



本 社	〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL：(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL：(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL：(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL：(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL：(050)3508-7912
宮 崎 事 務 所	〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL：(0985)25-7051

※九州北部営業所は福岡営業所に名称を変え、令和8年6月8日より以下の住所に移転致します。

電話番号の変更はありません。

<福岡営業所>

〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-13