

サンケイ化学 農薬登録情報

ソイリーン

クロルピクリン・D-Dくん蒸剤

登録番号：農林水産省登録第 22163 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：クロルピクリン・・・・・・・・41.5%

1,3-ジクロロプロペン・・・54.5%

毒性：劇物

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ソイリーン」が平成 30 年 9 月 12 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「豆類（未成熟）」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「ホモブシス腐敗病」を追加する。
- ・対象雑草名「一年生雑草」の使用方法「耕起整地後、30cm 間隔の柵り状に深さ約 15cm に 2~3mL ずつ注入し、直ちに覆土し、ポリマルチ、ビニール等で被覆する。」を「耕起整地後、30cm 間隔の柵り状に深さ約 15cm に所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリマルチ、ビニール等で被覆する。」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法】

次ページに掲載する。

【使用上の注意事項】

製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数	
にんじん	しみ腐病	30L/10a (1穴当り3mL)	作付けの10～15 日前まで	1回	耕起整地後 30cm間隔のフ リ状に深さ約 15cmに所定量 を注入し、直ち に覆土し、ポリエ レン、ビニール等 で被覆する。	1回	1回	
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)						
ごぼう	黒あざ病	30L/10a (1穴当り3mL)						2回以内 (床土1回以内)
すいか	つる割病 黒点根腐病							20～30L/10a (1穴当り2～3mL)
	さやいんげん	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
メロン	黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病	30L/10a (1穴当り3mL)						2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
	だいこん	バーティシリウム黒点病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						20～30L/10a (1穴当り2～3mL)
はくさい	黄化病 根くびれ病	30L/10a (1穴当り3mL)						2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
キャベツ	苗立枯病 (リゾクニア菌)	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)						
	未成熟そらまめ							ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ
なす	青枯病	30L/10a (1穴当り3mL)						2回以内 (床土1回以内)
トマト ミニトマト	萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)						3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)
	青枯病	30L/10a (1穴当り3mL)						
きゅうり	つる割病 ホモプシス腐敗病	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)						3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
ピーマン とうがらし類	青枯病	30L/10a (1穴当り3mL)						1回
かぼちゃ	立枯病							
こまつな	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)						2回以内 (床土1回以内)
レタス かぶ								1回
豆類(未成熟、 ただし、さやい んげん、未成熟 そらまめ、さや えんどう、実え んどうを除く)								1回
ほうれんそう	萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a (1穴当り3mL)	2回以内 (床土1回以内)					
	しょうが			根茎腐敗病				

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ケルビダリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	そうか病 青枯病	30L/10a (1穴当り3mL)	作付けの10～15 日前まで	1回	耕起整地後 30cm間隔のドリ リ状に深さ約 15cmに所定量 を注入し、直ち に覆土し、ポリエ レン、ビニール等 で被覆する。	1回	
	かんしょ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					
立枯病		30L/10a (1穴当り3mL)					
さといも	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
やまのいも	根腐病 褐色腐敗病	30L/10a (1穴当り3mL)					
	炭疽病	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
いちご	萎黄病 ネグサレセンチュウ						
	こんにゃく	ネコブセンチュウ					
ねぎ		根腐病					
	白絹病	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
さやえんどう 実えんどう みょうが(花穂) みょうが(茎葉) にがうり 葉しょうが	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
	オクラ	苗立枯病				30L/10a (1穴当り3mL)	
セルリー		ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ				20～30L/10a (1穴当り2～3mL)	
	きく	萎黄病				30L/10a (1穴当り3mL)	
半身萎凋病		20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
ストック	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
	チューリップ	球根腐敗病				30L/10a (1穴当り3mL)	
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ		20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
カーネーション	萎凋細菌病	30L/10a (1穴当り3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
トルコギキョウ	根腐病 立枯病	30L/10a (1穴当り3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り2～3mL)					
花き類・観葉植物 (ストック・チューリップ・ きく・カーネーション・ト ルコギキョウを除く)	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
たばこ	ネコブセンチュウ	(畦内土壌注入) 1穴当り2～3mL				作付けの30日前 まで	
	立枯病						

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ケルピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
にんじん だいこん はくさい かぼちゃ ばれいしょ かんしょ さといも やまのいも こんにやく オクラ 豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	一年生雑草	20~30L/10a (1穴当り2~3mL)	作付の 10~15日前	1回	耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。	1回	1回
ごぼう なす ほうれんそう しょうが みょうが(花穂) みょうが(茎葉) にがうり 葉しょうが さやえんどう 実えんどう						2回以内 (床土1回以内)	
すいか トマト ミニトマト きゅうり ピーマン とうがらし類 いちご ねぎ セルリー さやいんげん						3回以内 (床土1回以内、圃場2回以内)	
花き類・観葉植物 メロン キャベツ 未成熟そらまめ						2回以内 (床土1回以内、圃場1回以内)	