

サンケイ化学 農薬登録情報

クミアイダコニール 1000

TPN 水和剤

登録番号：農林水産省登録第 16824 号（登録会社：クミアイ化学工業株式会社）

有効成分：TPN・・・40.0% FRACコード：M05

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「クミアイダコニール 1000」は令和元年 12 月 18 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「きゅうり」、適用病害虫名「べと病」に希釈倍数「33 倍」、使用液量「10L/10a」、使用方法「常温煙霧」を追加する。
- 作物名「きゅうり」の TPN を含む農薬の総使用回数を「10 回以内（土壌灌注は 2 回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 8 回以内）」から「10 回以内（土壌灌注は 2 回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 8 回以内）」に変更する。
- 作物名「なす」、適用病害虫名「うどんこ病」に希釈倍数「33 倍」、使用液量「10L/10a」、使用方法「常温煙霧」を追加する。
- 作物名「トマト、ミニトマト」に適用病害虫名「褐色輪紋病」を追加する。
- 作物名「てんさい」の使用時期「収穫 45 日前まで」を「収穫 30 日前まで」にする。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	べと病 炭疽病 うどんこ病 灰色かび病 黒星病 褐斑病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	8回以内	散布	10回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)
トマト	疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 褐色輪紋病						6回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
	ミニトマト						疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 斑点病 褐色輪紋病
てんさい	褐斑病			収穫30日前まで	3回以内		3回以内

土壌灌注として使う場合

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	苗立枯病 (リゾクシア菌)	1000倍	3L/㎡	は種時又は活着後 但し、定植14日後 まで	2回以内	土壌灌注	10回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)

常温煙霧として使う場合

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	べと病	33倍	10L/10a	収穫前日まで	8回以内	常温煙霧	10回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)
なす		うどんこ病				4回以内		4回以内

【注意事項の変更等について】

主な変更事項

【変更後】

- ・誤飲のないように注意すること。
 - ・本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付かないように注意すること。
付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
 - ・使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
 - ・作業後は直ちに身体を洗い流し、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換すること。
 - ・かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。
- その他、常温煙霧の使用方法に関する注意事項が変更になっています。(略)

なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588