# サンケイ化学 農薬登録情報

## <sup>サンケイ</sup>ダブルシューターSE

### 脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤

登録番号:農林水産省登録第24054号(登録会社:サンケイ化学株式会社)

有効成分:脂肪酸グリセリド・・・75.0% IRAC ]-ド: -

スピノサド・・・・・ 5.0% IRAC ]-ド: 5

毒 性:普通物(毒物、劇物でないものを指していう通称)

販売エリア : 全国

## 適用拡大登録のお知らせ

弊社登録製品「サンケイダブルシューターSE」は令和3年3月10日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「きゅうり」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	脂肪酸グリセリド を含む農薬の 総使用回数	スピノサドを 含む農薬の 総使用回数
ピーマントマト	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハダニ類 コナジラミ類	- 1000倍	100~300 l/10a	収穫前日まで			_	2回以内
ミニトマトなす	ハモグリバエ類 アザミウマ類 オオタバコガ				2回以内	散布		
きゅうり	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 ウリノメイガ							
ねぎ	シロイチモジヨトウ			収穫3日前 まで	3回以内			3回以内
花き類・ 観葉植物	ハダニ類 アザミウマ類			発生初期	2回以内			2回以内

#### 【使用上の注意事項の変更について】

- 当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。
- なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。

# ②サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL:(06)6305-5871
東京営業部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曽根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051