

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ダントツ水溶剤

クロチアニジン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 20798 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・16.0%（IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ダントツ水溶剤」は令和元年 12 月 4 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんしょ」を追加する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「カメムシ類」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「かんきつ」の希釈倍数「2000～4000 倍」に適用病害虫名「アオバハゴロモ」を追加する。
- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「コガネムシ類幼虫」を追加する。
- ・作物名「キウイフルーツ」の適用病害虫名「アオバハゴロモ」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

#### 【使用上の注意事項の変更等】

- ・今回の適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。
- なお、ご使用に際しましては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワアジンを 含む農薬の 総使用回数
かんしょ	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (植付前の処理は1 回以内、植付後は2 回以内)
しゅんぎく	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (は種時の土壌混 和は1回以内、散布 は3回以内)
	ハモグリバエ類						
なす	ミナミキイロアザミウマ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 テントウムシダマシ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元処 理及び定植時の土 壌混和は合計1回 以内、散布及び定 植後の株元散布は 合計3回以内)
	カメムシ類	2000～4000倍					
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	6回以内 (樹幹散布は3回以 内、散布は3回以 内)
	アオバハゴロモ						
	カネタタキ	2000倍					
	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ	20倍	100mL/樹	収穫150日 前まで	樹幹散布		
	ミカンキジラミ	40倍	200mL/樹				
りんご	カメムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	コガネムシ類幼虫						
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ カメムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	アオバハゴロモ	2000～4000倍					