

サンケイ化学 農薬登録情報

ディアナ SC

スピネトラム水和剤

登録番号：農林水産省登録第 22910 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：スピネトラム・・・11.7%

殺虫剤分類：5

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ディアナ SC」は令和 7 年 10 月 1 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「みしまさいこ」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」の希釈倍数「2500 倍」を「2500～5000 倍」に変更する。
- ・作物名「かんしょ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」を追加し、希釈倍数「32 倍」および「64 倍」をそれぞれ「32～40 倍」および「40～80 倍」に、使用液量「0.8ℓ/10a」を「0.8～1.6ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「はくさい」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 2 回以内）」を「3 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後は 2 回以内）」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加し、スピネトラムを含む農薬の総使用回数「3 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 2 回以内）」を「3 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後は 2 回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く）」、「こまつな」および「なばな類」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「カリフラワー」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 2 回以内）」を「3 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後は 2 回以内）」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加し、使用液量「1.6ℓ/10a」を「1.6～3.2ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「らっきょう」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3 回以内（種球浸漬は 1 回以内、散布は 2 回以内）」を「3 回以内（植付前までの処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。
- ・作物名「にんじん」に適用病害虫名「キアゲハ」を追加する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の希釈倍数「2500 倍」に適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。

【適用病害虫名および使用方法（適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
みしまさいこ	ハスモンヨトウ	2500～5000倍	100～300 ℓ / 10a	収穫前日まで	4回以内 (1年間に2回以内)	散布	4回以内 (1年間に2回以内)
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ ヒルガオハモグリガ	32～40倍	0.8～1.6 ℓ / 10a		2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		40～80倍	1.6 ℓ / 10a				
はくさい	アザミウマ類 ウワバ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000倍	100～300 ℓ / 10a			散布	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後は2回以内)
キャベツ	アザミウマ類	50～200倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm・使用土壌 約3～4 ℓ)当り0.5 ℓ	育苗期後半	1回	灌注	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後は2回以内)
	アザミウマ類 ウワバ類 ハモグリバエ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000倍	100～300 ℓ / 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
	アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	48倍	1.6～3.2 ℓ / 10a			無人航空機による散布	
		96倍	3.2 ℓ / 10a				
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、 チンゲンサイ、 なばな類を除く)	アザミウマ類 ハモグリバエ類 コナガ ハスモンヨトウ	2500～5000倍	100～300 ℓ / 10a			散布	2回以内
こまつな	ハクサイダニ	2500倍					
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000倍					

【適用病害虫名および使用方法（適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
なばな類	アザミウマ類 ハモグリバエ類 コナガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ	2500～5000倍	100～300 ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
カリフラワー	アザミウマ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ						3回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後は2回以内)
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ					無人航空機 による散布	2回以内
	アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ	48倍	1.6～3.2 ℓ /10a				
			96倍		3.2 ℓ /10a		
らっきょう	ネダニ類	2500倍	—	植付前	1回	30分間 種球浸漬	3回以内 (植付前までの処理は1回以内、 植付後は2回以内)
	アザミウマ類 ハモグリバエ類	2500～5000倍	100～300 ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
にんじん	キアゲハ ハスモンヨトウ						
トマト ミニトマト	コナジラミ類 チバクロバネキノコバエ	2500倍					
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ トマトキバガ ハスモンヨトウ	2500～5000倍					



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL : (099) 268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL : (0985) 25-7051