

サンケイ化学 農薬登録情報

バイオセーフ

スライム カホカサ 剤

登録番号：農林水産省登録第 21503 号（登録会社：株式会社イ・ディー・エフ（株））

有効成分：スライム カホカサ オル株の感染態 3 期幼虫・・・250 万頭/g

RACコード：(生)

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「バイオセーフ」が令和元年 9 月 11 日付で下記の内容の適用拡大をいたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「しいたけ（菌床栽培）」、「しいたけ（原木栽培）」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法】

別紙 1 に記載する。

【注意事項の変更について】

19)、20) を追加し、赤字の記載内容を追加する。

【変更後】

19) 本剤をしいたけ（菌床栽培）のナガドキノコバエ類およびムラサキアツバに使用する場合には以下の点にも留意すること。

- ①菌床全体にむらなくしみわたるように十分量を散布すること。
- ②菌床への散水、または水洗浄の作業をした後に散布すること。

20) 本剤をしいたけ（原木栽培）のハラアカコブカミキリに使用する場合には以下の点にも留意すること。

- ①本剤を使用する場合は、夕刻又は曇天、少雨時の散布が望ましい。
- ②原木への散水作業をした場合、その直後に散布すること。
- ③散布後、激しい降雨が見られた場合は、効果が低下する可能性があるため、再度散布すること。

なお、ご使用の際は製品に貼付してあるラベルをご覧ください。



サンケイ化学株式会社

本社
九州北部営業所
宮崎事務所

〒891-0122
〒841-0025
〒880-0056

鹿児島市南栄二丁目9
佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3
宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(099)268-7588
TEL:(0942)81-3808
TEL:(0985)25-7051

別紙1 【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スタイナーネマカーボホフサエを含む農薬の総使用回数				
芝	シバオサゾウムシ幼虫 タマナヤガ	2億5000万頭 (約100g)/10a	500～ 2000L/10a	発生初期	—	散布	—				
かんしょ(茎葉)	アリモドキゾウムシ			成虫発生初期				土壌灌注			
かんしょ	イモゾウムシ			老令幼虫発生期							
野菜類	ハスモンヨトウ			夏繭が形成される時期～羽化脱出前まで		—		土壌灌注			
豆類(種実)											
いも類											
果樹類	モモンクイガ	2500万頭 (約10g)	25L	幼虫発生期	—	虫糞が見られる所を中心に主幹部全体に散布	—				
食用さくら(葉) さくら	コスカシバ					2.5L		木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入			
	クビアカツヤカミキリ					25L		虫糞が見られる所を中心に主幹部全体に散布			
ふさすぐり	スグリコスカシバ					2.5～25L		木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで散布又は樹幹注入			
なし	ヒメボクトウ					2.5L		産卵期～ 幼虫喰入期	—	被害部を中心に薬液が滴るまで散布	
りんご										主枝および主枝の産卵箇所薬液が滴るまで塗布又は散布	
いちよう										樹頂部に散布	
いちよう(種子)										樹幹部に薬液が滴るまで散布	
たらき	センノカミキリ幼虫					7500万頭 (約30g)		25L	幼虫発生初期	—	被害菌床全体へ薬液が滴るまで散布
いちじく	キボシカミキリ幼虫										被害痕が見られる所を中心にほだ木表面全体に散布
ヤシ	ヤシオオオサゾウムシ幼虫					2500万頭 (約10g)		2.5～5L	幼虫発生期	—	1株あたり300mL 株元灌注
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ幼虫	50L	土壌灌注								
オリーブ(葉)											
しいたけ (菌床栽培)	ナガマドキノコバエ類	2億5000万頭 (約100g)/10a	500～ 2000L/10a	老令幼虫発生期	—	土壌灌注					
	ムラサキアツバ										
しいたけ (原木栽培)	ハラアカコバカミキリ										
花き類・ 観葉植物	キンケクテプトゾウムシ幼虫	70～140L	幼虫発生初期	1株あたり300mL 株元灌注							
	ハスモンヨトウ	2億5000万頭 (約100g)/10a	500～ 2000L/10a	老令幼虫発生期	土壌灌注						