

サンケイ化学 農薬登録情報

ベルコートフロアブル

イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤

登録番号：農林水産省登録第 19884 号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジンアルベシル酸塩・・・30.0%（FRACコード：M7）

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベルコートフロアブル」は令和3年9月8日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「なす」に適用病害虫名「褐紋病」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」及び「なす」に使用方法「常温煙霧」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

【使用上の注意事項等の変更】

【追加】

8 使用上の注意事項

(16) 常温煙霧処理する場合には、次の事項に注意すること。

- ①専用の常温噴霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ②作業はできるだけ夕刻に行い、作業終了後6時間以上密閉すること。

【追加】

9 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法の追加

(5) 常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日 まで	7回以内	散布	7回以内
なす	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病				3回以内		3回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	150ml/10a	10ℓ/10a	収穫前日 まで	7回以内	常温煙霧	7回以内
なす		灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病				3回以内		3回以内



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051