

サンケイ化学 農薬登録情報

ベルコートフロアブル

イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤

登録番号：農林水産省登録第 19884 号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジンアルベシル酸塩・・・30.0% 殺菌剤分類：M7

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ベルコートフロアブル」は令和 6 年 2 月 28 日付で下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「レタス」を追加する。
- ・作物名「チューリップ」に適用病害名「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「かぼちゃ」の希釈倍数「1,000 倍」を「1,000～2,000 倍」に変更する。
- ・作物名「みかん」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量を以下の通りに変更する。
適用病害名「灰色かび病」について使用液量「4 ℓ/10a」及び「8 ℓ/10a」をそれぞれ「4～5 ℓ/10a」、「8～10 ℓ/10a」に変更する。
適用病害名「貯蔵病害（青かび病）」及び「貯蔵病害（緑かび病）」について使用液量「5 ℓ/10a」及び「10 ℓ/10a」をそれぞれ「4～5 ℓ/10a」、「8～10 ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「みかん」の使用方法「無人航空機による散布」について使用時期「収穫 3 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「チューリップ」の使用時期「発生初期」を「発病前～発病初期」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」の適用病害名「灰色かび病」、「貯蔵病害（青かび病）」及び「貯蔵病害（緑かび病）」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【適用病害名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【注意事項の変更について】

- ・当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。
- ・なお、使用に際しては商品に貼付してあるラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL：(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19

山本ビル TEL：(0985)25-7051

【適用病害名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1,000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1,000～ 2,000倍					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病)	10倍	4～5ℓ/10a		無人航空機 による散布		
	貯蔵病害(緑かび病)	20倍	8～10ℓ /10a				
かんきつ (みかんを 除く)	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病	1,000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1,000～ 2,000倍					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病)	10倍	4～5ℓ/10a		無人航空機 による散布		
	貯蔵病害(緑かび病)	20倍	8～10ℓ /10a				
レタス	菌核病	1,000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内
かぼちゃ	うどんこ病	1,000～ 2,000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	4回以内		4回以内
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病	1,000倍		発病前～ 発病初期	8回以内		8回以内