

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20889 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ベノミル・・・・・・・・・・50.0% FRACコード：1

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録のお知らせ

弊社取扱い商品「ベンレート水和剤」は令和3年7月21日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かぼちゃ」および「ズッキーニ」を追加する。
- ・作物名「小麦」の使用時期「収穫7日前まで」に適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「斑点病」、使用方法「散布」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（植付時までの処理は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「なす」の希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「フザリウム立枯病」を追加する。
- ・作物名「みかん」および「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（白かび病）」、希釈倍数「4000倍」を追加する。
- ・作物名「しゃくやく（薬用）」に適用病害虫名「根黒斑病」、使用方法「10分間苗基部浸漬」および「16時間苗基部浸漬」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「8回以内」を「9回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は8回以内）」に変更する。
- ・作物名「豆類（種実）」を「野菜類」に統合し、削除する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- ・次ページに記す。

【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等に変更はありません。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベノミルを含む 農薬の 総使用回数
かぼちゃ	白斑病	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
ズッキーニ	菌核病	3000倍					
小麦	雪腐病	2000～3000倍	60～150ℓ/10a	根雪前	1回	散布	4回以内 (種子への 処理は1回以 内、は種後は 3回以内)
	赤かび病			収穫7日前 まで	2回以内		
	うどんこ病	2000倍					
かんしょ	つる割病 黒斑病	500～1000倍	—	植付前	1回	20～30分間 苗基部浸漬	4回以内 (植付時ま での処理は1回 以内、は種後 は3回以内)
	基腐病					30分間 苗基部浸漬	
	黒斑病	種いも量の0.4%				種いも粉衣	
	つる割病	500～1000倍		20～40ml/株	挿苗時	株元灌注	
	斑点病	1000倍		100～300ℓ/10a	収穫7日前 まで	3回以内	
なす	半身萎凋病	500倍	200～300ml/株	定植後～ 収穫14日前 まで	3回以内	土壌灌注	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
		1000倍	400～600ml/株				
	黒枯病 灰色かび病	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで		散布	
	菌核病 褐紋病 フザリウム立枯病	2000倍					
みかん	そうか病 灰色かび病	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
	貯蔵病害(白かび病)	4000倍					
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	4000～6000倍					
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(黒斑病)		2回以内	2回以内			
しゃくやく (薬用)	根黒斑病	20倍	—	植付前	1回	10分間 苗基部浸漬	9回以内 (植付前ま での処理は1回 以内、植付後 は8回以内)
		500倍				16時間 苗基部浸漬	
	灰色かび病	1000倍				100～300ℓ/10a	
野菜類	フザリウム菌による病害	乾燥種子重量の 0.16%	—	は種前	1回	種子処理機に よる種子粉衣	1回