

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20889 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ベノミル・・・・・・・・・・50.0%

殺菌剤分類： 1

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録のお知らせ

弊社取扱い商品「ベンレート水和剤」は令和 6 年 3 月 13 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「つる割病」の使用方法「20～30 分間苗基部浸漬」を「20～30 分間苗浸漬」に変更する。
- ・作物名「しょうが」に適用病害虫名「褐色しみ病」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベノミル を含む農薬の 総使用回数
かんしょ	黒斑病	500～ 1000倍	—	植付前	1回	20～30分間 苗基部浸漬	4回以内 （植付時までの処理 は1回以内、植付後 は3回以内）
	つる割病					20～30分間 苗浸漬	
	基腐病					30分間 苗浸漬	
	黒斑病	種いも重の 0.4%				種いも粉衣	
	つる割病	500～ 1000倍	20～40 ml/株	挿苗時		株元灌注	
	斑点病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	
しょうが	いもち病 褐色しみ病			収穫21日前 まで	2回以内		2回以内

【使用上の注意事項等の変更について】

○変更後

- なしの枝枯病、胴枯病に対してマシン油乳剤で希釈して塗布する場合は、病斑部及びその周辺に1～2回塗布すること。なお、病斑部を削り取った後塗布する場合は木質部が見えない程度に表皮を薄く削ること。また、マシン油乳剤はベンレート水和剤に加用の登録のある剤を使用し、マシン油乳剤の注意事項を確認のうえ使用すること。
- かんしょの基腐病に使用する場合は、苗全体が薬液に浸かるように処理すること。
- なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご一読ください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9

TEL: (099)268-7588