

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイマラソン乳剤

マラソン乳剤

登録番号：農林水産省登録第 2532 号（登録会社：サンケイ化学(株)）

有効成分：マラソン・・・50.0% 殺虫剤分類：1B

毒 性：普通物（毒物及び劇物でないものを指していう通称）

販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイマラソン乳剤」が令和 6 年 5 月 15 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「だいす」、「あずき」および「えんどうまめ」の適用病害虫名「ハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000～3000 倍」を「1000～3000 倍」に変更する。
- 作物名「いんげんまめ」の適用病害虫名「ハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000 倍」を「1000～2000 倍」に、「2000～3000 倍」を「1000～3000 倍」に変更する。
- 作物名「だいこん」、「かぶ」、「はくさい」、「キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「きゅうり」、「メロン」、「うり類（漬物用）」、「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「2000～3000 倍」を「1000～3000 倍」に変更する。
- 作物名「豆類（未成熟）」の希釈倍数「2000 倍」を「1000～2000 倍」に、「2000～3000 倍」を「1000～3000 倍」に変更する。
- 作物名「かんきつ（なつみかんを除く）」、「りんご」、「なし」、「もも」、「うめ」、「おうとう」、「ぶどう」および「かき」の希釈倍数「2000～3000 倍」を「1000～3000 倍」に変更する。
- 作物名「びわ」に適用病害虫名「ビワキジラミ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

- 次ページ以降に記す

【使用上の注意事項】

- 当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。
- ご使用に際しては製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL : (099)268-7588
九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 TEL : (050)3508-7912
宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL : (0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数	
だいす あずき えんどうまめ	ハモグリバエ類 マメシンクイガ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～3000倍						
いんげんまめ	ハモグリバエ類 マメシンクイガ	1000倍		収穫14日前まで	6回以内		6回以内	
	インゲンテントウ	1000～2000倍						
	アザミウマ類 ア布拉ムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～3000倍						
だいこん	アオムシ カブラハバチ ナモグリバエ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内	
	アブラムシ類	1000～3000倍						
かぶ	アオムシ カブラハバチ ナモグリバエ	1000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内	
	アブラムシ類	1000～3000倍						
はくさい キャベツ	アオムシ カブラハバチ	1000倍	収穫3日前まで	6回以内	散布	6回以内	6回以内	
	アザミウマ類 ア布拉ムシ類	1000～3000倍						
カリフラワー プロッコリー	アオムシ カブラハバチ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	アザミウマ類 ア布拉ムシ類	1000～3000倍						
たまねぎ	ハモグリバエ類	1000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内	
	アザミウマ類 ア布拉ムシ類	1000～3000倍						
ねぎ	ネギハモグリバエ	1000倍	収穫3日前まで	6回以内	散布	6回以内	6回以内	
	アザミウマ類 ア布拉ムシ類	1000～3000倍						
きゅうり メロン うり類(漬物用)	ウリハムシ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍						
かぼちゃ	ウリハムシ	1000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内	
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍						
すいか	ウリハムシ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前まで	6回以内	散布	6回以内	
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍						
豆類(未成熟)	カメムシ類 ハモグリバエ類 マメシンクイガ	1000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
	インゲンテントウ	1000～2000倍						
	アザミウマ類 ア布拉ムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～3000倍						

○次ページに続く

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数
かんきつ (なつみかんを除く)	カイガラムシ類 ハマキムシ類 アオバハゴロモ ヤノネカイガラムシ 若齢幼虫	1000～2000倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～3000倍					
りんご	モモシンクイガ	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 (休眠期から芽出直後までは1回以内)
	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシンクイ	1000～2000倍					
	アブラムシ類 ハダニ類 リンゴワタムシ	1000～3000倍					
なし	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシンクイ	1000～2000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内 (休眠期は1回以内)
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍					
もも	モモシンクイガ	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	6回以内	散布	5回以内
	カイガラムシ類 ナシヒメシンクイ	1000～2000倍					
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍					
うめ	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～2000倍	200～700ℓ /10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	5回以内 (休眠期の50倍 希釗散布は1回以内)
	ア布拉ムシ類	1000～3000倍					
とうとう	ハマキムシ類	1000～2000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内 (休眠期の50倍 希釗散布は1回以内)
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍					
ぶどう	キンケクチブトゾウ ムシ成虫	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	6回以内
	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～2000倍					
	ア布拉ムシ類 ハダニ類	1000～3000倍					
かき	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～2000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	4回以内
	イラガ類	1000～3000倍					
びわ	ビワキジラミ	2000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	ア布拉ムシ類	2000～3000倍					