

サンケイ化学 農薬登録情報

ベストガード粒剤

ニテンピラム粒剤

登録番号：農林水産省登録第 19103 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ニテンピラム・・・1.0% 殺虫剤分類：4A

毒性：普通物（毒物及び劇物でないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ベストガード粒剤」は令和 8 年 9 月 9 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲及び使用方法（変更内容）】

- ・作物名「しゅんぎく」の適用病害虫名「マメハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「わけぎ」および「あさつき」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「なす」、「すいか」および「メロン」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「いちご」の適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」を「クロバネキノコバエ類」に変更し、使用方法「生育期株元散布」を「株元散布」に変更する。

※適用表は次ページに記載する。

【使用上の注意事項等の変更】

- ・当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。
- ・なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:099-268-7588
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎県宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:0985-25-7051

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
しゅんぎく	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	9kg/10a	定植時	1回	植溝処理 土壌混和	2回以内 (定植時の 土壌混和は 1回以内、 株元処理は 1回以内)
			収穫3日前 まで		生育期 株元処理	
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	5g/培土 ℓ	は種時		育苗培土混和	4回以内 (定植時までの 処理は 1回以内、 定植後は 3回以内)
	アザミウマ類	6kg/10a			作条処理 土壌混和	
		セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、 使用土壌約3～4 ℓ) 当り50g	育苗期後半 ～定植当日		散布	
		アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 ハモグリバエ類	6kg/10a		定植時	
	アザミウマ類 ハモグリバエ類	収穫前日 まで		3回 以内	株元処理	
わけぎ あさつき	ハモグリバエ類		定植時	1回	植溝処理 土壌混和	1回
なす	アブラムシ類	5g/培土 ℓ	は種時又は 鉢上げ時		1回	育苗培土混和
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	株元処理		
		セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、 使用土壌約1.5～4 ℓ) 当り50g	育苗期後半	散布		
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和		
	アブラムシ類	2g/株	収穫前日 まで	3回 以内	生育期 株元処理	
すいか メロン	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	株元処理	
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
いちご	アブラムシ類	1g/株		収穫前日 まで		3回 以内
	クロバネキノコバエ類	1～2g/株				