

平成 27 年 9 月 14 日

お客様各位

サンケイ化学株式会社
九州営業部

バリダシン液剤 5 の負の登録内容の変更について

残暑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社登録品目「バリダシン液剤 5」について、下記のように負の適用拡大申請中であり、平成 27 年 11 月 11 日(水)の登録に向けて調整しておりますのでご案内いたします。

お手数をお掛けしますが、ご理解とお取計らいのほどよろしくお願い申し上げます。

記

対象品目名：サンケイバリダシン液剤 5

登録番号：農林水産省登録 第 17388 号

1：変更内容

1. いちご

作物名「いちご」を削除。

2. なす

作物名「なす」を削除。

3. ねぎ

使用時期「収穫 14 日前まで」⇒「収穫 21 日前まで」

4. みつば

使用時期「移植後 但し収穫 21 日前まで」⇒「移植後、ただし収穫 21 日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込前まで」

2：登録上の変更理由：

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイツを含む農薬の総使用回数
いちご	芽枯病 角斑細菌病	1000倍	100~300 L/10a	収穫開始 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
なす	青枯病	500倍		収穫前日 まで	8回以内		8回以内
みつば	立枯病	800倍		育苗期 移植後 但し 収穫21日 前まで	1回 3回以内		4回以内 (育苗期は 1回以内)
ねぎ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	400倍	6L/m ²	は種時	1回	灌注	2回以内 (は種時の灌注 は1回以内、 散布及び 株元散布は 合計1回以内)
	軟腐病	500倍	100~300 L/10a	収穫14日 前まで		散布	
	白絹病					株元散布	

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイツを含む農薬の総使用回数
みつば	立枯病	800倍	100~ 300 L/10a	育苗期	1回	散布	4回以内 (育苗期は 1回以内、 移植後は 3回以内)
				移植後 但し収穫21日 前まで、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	3回 以内		
ねぎ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	400倍	6L/m ²	は種時	1回	灌注	2回以内 (は種時の灌注 は1回以内、 散布及び 株元散布は 合計1回以内)
	軟腐病	500倍	100~ 300 L/10a	収穫21日 前まで		散布	
	白絹病					株元散布	

以上