

サンケイ化学 農薬登録情報

ベフキン水和剤

登録番号:農林水産省登録 第18088号(登録:サンケイ化学株)

有効成分:イミノダジンを含む農薬の総使用回数...7.0%

8-ヒドロキシキノリン銅...50.0%

毒性:劇物

販売エリア:全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社製品『ベフキン水和剤』が平成22年5月12日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「麦類(小麦を除く)」の有機銅を含む農薬の総使用回数を「3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内)」から「2回以内」に変更。
- ・適用表に使用量の欄を設け、既登録の作物名「りんご」「みかん」「なし」「麦類(小麦を除く)」及び「小麦」に使用量を記載。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノダジンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病	750~1000倍	200~700 L/10a	収穫14 日前まで	3回以内	散布	8回以内液剤及び水 和剤は合計6回以内 (開花期以降は3回 以内、塗布剤は2回 以内)	7回以内(塗布は 3回以内、散布は 4回以内)
	輪紋病 すす点病 すす斑病 褐斑病 炭疽病							
みかん	灰色かび病 そうか病 黒点病	1000倍		収穫30 日前まで	3回以内		3回以内	5回以内
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病	300倍	100~ 200L /10a	収穫45 日前まで	4回以内	散布	5回以内(塗布剤は 2回以内、液剤は1 回以内)	9回以内
麦類(小麦 を除く)	雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	300倍	100~ 200L /10a	根雪前	2回以内	3回以内(種子への 処理は1回以内、散 布は2回以内)	2回以内	
小麦	雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	300倍	100~ 200L /10a			4回以内(種子への 処理は1回以内散布 及び無人ヘリ散布は 合計3回内、出穂期 以降は1回以内)	5回以内(種子へ の処理は1回以 内)	

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951