

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

登録番号 : 農林水産省登録 第20889号(登録会社:住友化学(株))

有効成分 : ベンレート50.0%

毒性 : 普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)

販売エリア : 鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ベンレート水和剤』が平成26年9月24日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「小麦」の適用病害虫名「赤かび病」の本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更。
- 作物名「えんどうまめ」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更。
- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の本剤の使用回数及びベンレートを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「2回以内」に変更。
- 作物名「かんきつ(みかんを除く)の適用病害虫名「そうか病」、「灰色かび病」を削除。
- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更。
- 作物名「かき」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更。
- 作物名「ぶどう」の適用病害虫名「つる割病」の希釈倍数又は使用量を「500倍」から「200~500倍」に変更。
- 作物名「くり」の使用時期「裂果まで」を「裂果前 但し、収穫14日前まで」に変更。
- 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)」、「えだまめ」、「さやいんげん」、「さやえんどう」に適用病害虫名「立枯病」、使用方法「灌注」を追加し、ベンレートを含む農薬の総使用回数を「4回以内(種子粉衣は1回以内、散布は3回以内)」から「6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内)」に変更。
- 作物名「茶」の使用時期「散布」の使用時期を「摘採21日前まで」から「摘採14日前まで」に変更。
- 作物名「ネクタリン」を追加。
- 作物名「いちじく」を追加。
- 作物名「ほうれんそう」を追加。
- 作物名「甘長とうがらし」を追加。

負の変更理由

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンレートを含む農薬の総使用回数
小麦	赤かび病	2000~3000倍	60~150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	雪腐病			根雪前	1回		
えんどうまめ	菌核病	1000~2000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)
	褐紋病						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペナルを含む農薬の総使用回数		
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(黒斑病)	4000~6000倍	200~700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
かき	落葉病	2000~3000倍		収穫前日まで	6回以内		6回以内		
	うどんこ病			休眠期	1回		4回以内 (休眠期処理は1回以内、 散布は3回以内)		
	炭疽病								
ぶどう	褐斑病 うどんこ病 灰色かび病 晩腐病	2000倍						収穫45日前まで	3回以内
	黒とう病	200~500倍						収穫45日前まで	3回以内
	つる割病	200~500倍							
	枝膨病	200倍							
	晩腐病	200~500倍							
芽枯病	2000倍								
くり	実炭疽病	2000~3000倍	裂果前 但し、 収穫14日前まで	4回以内	4回以内				
豆類(未成熟、 ただし、えだまめ、 さやいんげん、さやえんどう を除く)	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 灌注は2回以内、散布 は3回以内)			
	立枯病	1000倍	3L/m ²	発芽14日後まで	2回以内		灌注		
えだまめ	菌核病 紫斑病	2000倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内		散布		
	立枯病	1000倍	3L/m ²	発芽14日後まで	2回以内		灌注		
さやいんげん	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内		散布		
	立枯病	1000倍	3L/m ²	発芽14日後まで	2回以内		灌注		
さやえんどう	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内		散布		
	立枯病	1000倍	3L/m ²	発芽14日後まで	2回以内		灌注		
茶	炭疽病 白星病 輪斑病 褐色丸星病	2000~3000倍	200~400 L/10a	摘採14日前まで	1回		散布	1回	
	白紋羽病	1000~2000倍	—	—					苗木根部 24時間浸漬
	ネクタリン	灰星病 黒星病 ホモフシス腐敗病	2000~3000倍	200~700 L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		
		いちじく	枝枯病	1000倍	1~10L/	収穫30日前まで	5回以内		株元灌注
ほうれんそう		萎凋病	2000倍	3L/m ²	収穫21日前まで	2回以内	灌注		
甘長とうがらし	炭疽病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(種子粉衣は1 回以内、は種後は2回 4回以内(種子粉衣は1 回以内、は種後は3回		

<注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951

深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122