

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイEPN乳剤

登録番号：農林水産省登録 第8227号

有効成分：EPN・・・45.0%

毒性：毒物

販売エリア：全国

### (負の)適用拡大登録取得のお知らせ

弊社製品『EPN乳剤』が平成23年10月26日付けで下記のように(負の)適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

・作物名「メロン(露地栽培)」を削除。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	EPNを含む農薬の総使用回数			
稲	ニカメイチュウ第一世代	1500~2000倍		収穫60日前まで	1回	散布	1回			
	サンカメイチュウ第一世代 イネクロカメムシ イネカラバエ アワヨトウ	1000倍								
	イネハモグリバエ イネドロオイムシ イネツトムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ	2000倍								
キャベツ(露地栽培)	ゾウムシ類	1000倍						収穫14日前まで	2回以内	2回以内
	アブラムシ類 アザミウマ類 ヨトウムシ アオムシ ダイコンシンクイムシ	1000~2000倍								
カリフラワー(露地栽培) ブロッコリー(露地栽培)	ゾウムシ類	1000倍						収穫30日前まで	4回以内	4回以内
カリフラワー(露地栽培) ブロッコリー(露地栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類 ヨトウムシ アオムシ ダイコンシンクイムシ	1000~2000倍								
すいか(露地栽培)	アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類	1000~2000倍						収穫45日前まで	2回以内	2回以内
かぼちゃ(露地栽培)	アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類							収穫30日前まで	3回以内	3回以内
ねぎ(露地栽培)	タネバエ アザミウマ類 ネギハモグリバエ アブラムシ類							収穫45日前まで	1回	1回
しょうが(露地栽培)	ショウガダイメイチュウ		1000倍	収穫3日前まで	2回以内	2回以内				
かんしょ	ハスモントウ		100~300L	収穫3日前まで	2回以内	2回以内				

<注意事項について>

変更なし



**サンケイ化学株式会社**

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588  
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951