サンケイ化学 農薬登録情報

キルパー

登録番号: 農林水産省登録 第18525号(バックマン)

有効成分: カーバムナトリウム塩・・・30.0%

毒性: 普通物 販売エリア:全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『キルパー』が平成22年9月22日付けで 下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「こんにゃく」に適用病害虫名「乾腐病」及び「乾性腐敗病」を追加。
- ・作物名「こんにゃく」の適用病害虫名「一年生雑草」に使用量「原液として60L/10a」を追加。
- ・作物名「ピーマン」に適用病害虫名「苗立枯病」「萎凋病」「半身萎凋病」を追加。
- ・作物名「ピーマン」の適用病害虫名「一年生雑草」に使用量「原液として60L/10a」を追加。
- 作物名「やまのいも」に適用病害虫名「ネコブセンチュウ」を追加。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「黒腐菌核病」を追加。
- ・作物名「ピーマン」の適用病害虫名「ネコブセンチュウ」の使用量を「原液として40L/10a」から「原液として40 ~60L/10a」に変更。
- ・作物名「にら」に使用目的「ネダニ蔓延防止」を追加。
- ・作物名「にら」の使用目的「古株枯死」の使用時期を「は種又は定植の10~24日前まで」から「前作終了後からは種又は定植の15~24日前まで」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】変更作物のみ

作物名	適用病害虫名 適用雑草名 使用目的	使用量 (原液として L/10a)	使用方法方法番号方法		使用時期	カーバムナトリウム 塩を含む農薬の総 使用回数
ねぎ	白絹病、一年生雑草	40	С	A: 散布混和 所定量の薬液 を土壌表面に 散布し、直ちに 混和し被覆す る。 B:希釈散布/	植の10~2 4日前まで	
		60	Α			
	根腐萎凋病、一年生雑草		В			
	黒腐菌核病		Α			
ピーマン	ネコブセンチュウ	40~60 40	С		は種又は定 植の15~2 4日前まで	
	一年生雑草					
	苗立枯病、一年生雑草、萎凋病	60	Α	<u> </u>		
	萎凋病、半身萎凋病		В	予め被覆した		
こんにゃく	根腐病、一年生雑草	40	С	内で所定量の		
	乾腐病	60	С	薬液を水で希 釈し土壌表面		
			А	に散布又は潅		
	乾性腐敗病、一年生雑草			水する。		
やまのいも	根腐病、一年生雑草	60	Α	<u>C:注入</u>		
	ネコブセンチュウ	40~60	С	定量の薬液を 土壌中約15c		
にら	古株枯死	60	B,C	mの深さに注 入し直ちに被 覆又は覆土・鎮 圧する。	前作終了後 からは種又 は定植の15 ~ 24日前ま で	
	ネダニ蔓延防止		В			

<注意事項について>

- 【追 加】 ●本剤を施設使用する場合は、施設内に作物があると薬害を生じる恐れがあるので使用しないで下さい。特に、 仕切が不充分な連棟ハウスで暖房機の使用時には薬害を生じる恐れがあるので使用しないで下さい。
 - ●かんしょ、菊等挿し苗で定植する作物に本剤を使用する場合は、薬害を生じる恐れがあるので被覆期間を延長するか、ガス抜き耕起を充分に行ってください。
 - ●本剤の使用にあったては使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意して下さい。特に暦用適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951