

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイクレマート乳剤

登録番号: 農林水産省登録 第17664号(登録: サンケイ化学(株))
有効成分: プタミホス...50.0%
毒性: 普通物
販売エリア: 全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社製品『クレマート乳剤』が平成23年5月25日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「漬物用メロン」の適用雑草「一年生雑草」を追加。
- ・適用雑草名「畑地一年生雑草」を「一年生雑草」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プタミホスを含む農薬の総使用回数
メロン	一年生雑草	定植・マルチ前(雑草発生前)	砂壤土～植土	200～400 mL/10a	100～150 L/10a	1回	全面土壌散布	全域	1回
漬物用メロン									
すいか かぼちゃ									
レタス なす		定植前又は定植・マルチ前(雑草発生前)							
キャベツ きゅうり イチゴ		定植前(雑草発生前)							
ねぎ わけぎ あさつき		定植活着後(雑草発生前)但し定植10日後まで							
ばれいしょ さといも にんにく らっきょう やまのいも		植付後萌芽前(雑草発生前)							
らっかせい にんじん		は種後発芽前(雑草発生前)							
こんにゃく		植付後又は培土後(雑草発生前)但し収穫120日前まで							
グラジオラス		植付後(雑草発生前)							
きく(ホットマム)		アメリカナシカズラ							
	定植後(雑草発生揃期まで)		雑草茎葉散布又は全面土壌散布						

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブタミホスを含む農薬の総使用回数
たまねぎ(春播)	一年生雑草	定植後(雑草発生前) 但し収穫60日前まで	砂壤土～植土	200～400 mL/10a	100～150 L/10a	1回	全面土壌 散布	北海道	1回
たまねぎ(秋播)		定植後(秋期の雑草発生前) 但し収穫60日前まで							
アスパラガス		萌芽前(雑草発生前)							
ピーマン とうがらし類		定植前(雑草発生前)		200mL /10a					
はくさい とうがん ブロッコリー									
パセリ		は種後発芽前(雑草発生前)		200～400 mL/10a					
うど		定植後出芽前(根株養成圃) (雑草発生前)		200mL /10a					
ひろしまな		定植前(雑草発生前)							
わらび		株養成期(地上部なし) (雑草発生前)		200～400 mL/10a					
たばこ (折衷マルチ栽培)		植付10日前まで(雑草発生前)		200mL /10a					

<注意事項について>

変更なし



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951