

サンケイ化学 農薬登録情報

マイコシールド

登録番号:農林水産省登録 第16152号(登録会社:ゾエティス・ジャパン(株))
有効成分:アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン・・・31.5%
(オキシテトラサイクリンとして17.0%)
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品『マイコシールド』が平成27年2月20日付けで下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「だいこん」の散布液量100～300L/10aとする。
- ・作物名「かんきつ(みかんを除く)」「みかん」「あんず」を追加する。
- ・作物名「もも」「ネクタリン」「うめ」「すもも」「樹木類」の使用液量を200～700L/10aとする。
- ・作物名「パレイショ」の使用液量を100～300L/10aとする。

【適用病害虫名および使用方法(今回の拡大部分のみ記載)】

平成27年2月20日の拡大内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシテトラサイクリンを含む農薬の総使用回数			
だいこん	軟腐病	750～1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内			
かんきつ(みかんを除く)	かいよう病	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内		散布	2回以内		
みかん				収穫60日前まで						
おうとう				樹脂細菌病					1500倍	収穫7日前まで
もも	せん孔細菌病	1500～3000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	5回以内			散布	5回以内	
ネクタリン		1500倍		収穫28日前まで						
あんず	かいよう病	1500～3000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内				散布	2回以内
うめ		1500倍		収穫21日前まで	4回以内					4回以内
すもも	黒斑病	2000倍	200～700L/10a		3回以内					3回以内
樹木類	枝枯細菌病	1000倍		新梢伸長期～発病初期	5回以内					5回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシトラサイクリンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	軟腐病	1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内(種いもへの処理は1回以内)



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地

TEL:(099)268-7588

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11

TEL:(03)3845-7951

深谷営業所 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1

TEL:(048)551-2122

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島四丁目5-1

TEL:(06)6305-5871