

サンケイ化学 農薬登録情報

ショウリョクS粒剤

登録番号 : 農林水産省登録 第22997号 (登録会社:住友化学(株))
有効成分 : カルタップ[®]...5.3%
イマゾスルフロン[®]...0.3%
カフェンストール[®]...0.7%
ダイムロン[®]...1.7%
プロモブチド[®]3.0%

毒性 : 普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『ショウリョクS粒剤』が平成25年11月6日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「移植水稻」に適用病害虫名「イネトオイムシ」を追加
- 作物名「移植水稻」に適用病害虫名「オモダカ(近畿・中国・四国、九州)」を追加
- 作物名「移植水稻」に適用病害虫名「クログワイ」を追加
- 作物名「移植水稻」に適用病害虫名「コウキヤガラ」を追加
- 作物名「移植水稻」の適用地帯「関東・東山・東海・近畿・中国・四国・九州の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海・九州の早期栽培地帯」に「近畿・中国・四国の早期栽培地帯」を追加し、「関東・東山・東海・近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」に変更

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草等	使用時期	適用土壌	使用量	使用回数	使用方法	適用地帯	カルタップを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	カフェンストールを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	プロモブチドを含む農薬の総使用回数
移植水稻	スクリコガイ(食害防止)	移植直後～ノビエ2葉期、ただし移植後30日まで	砂壤土～埴土	3kg/10a	1回	湛水散布	関東・東山・東海・近畿・中国・四国・九州の普通期及び早期栽培地帯	6回以内(種もみ浸漬は1回以内、床土への混和、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内)	2回以内	1回	3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内
	イネトオイムシ											
	水田一年生雑草											
	マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ											
	オモダカ(近畿・中国・四国・九州)											
クログワイ コウキヤガラ												

<注意事項について>

【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2葉期までに時期を失ないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するように注意すること。
- ・ホタルイは2葉期まで、ウリカワは2葉期(関東・東山・東海・近畿・中国・四国は発生初期)まで、ミズガヤツリは2葉期(関東・東海・東山は発生初期)まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期までが本剤の散布適期である。
- ・浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行うこと。
- ・未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行うこと。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122