

サンケイ化学 農薬登録情報

バリダシン液剤5

登録番号：農林水産省登録 第17388号(登録会社:サンケイ化学(株))

有効成分：バリダマイシンA・・・5.0%

毒性：普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)

販売エリア：熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品『バリダシン液剤5』が平成25年4月24日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「白絹病」を追加。
- ・各作物に「使用液量」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物の

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数
もも	せん孔細菌病	500倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
かんきつ	かいよう病			収穫14日前まで			
すもも	黒斑病						
稲	紋枯病	1000倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内)
	疑似紋枯症(赤色菌核病菌)						
	疑似紋枯症(褐色菌核病菌)						
	疑似紋枯症(褐色紋枯病菌)						
	もみ枯細菌病	300倍	25L/10a				
稲(育苗箱)	苗立枯病(白絹病菌) 苗立枯病(リゾクテニア菌)	1000倍	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌約5L)1箱当たり500ml	は種時～発病初期	1回	灌注	
ばれいしょ	黒あざ病	200倍	—	貯蔵前又は植付前	1回	瞬時～10分間種いも浸漬又は種いもに散布	7回以内(種いもへの処理は1回以内、植付後は6回以内)
	青枯病	500倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	6回以内	散布	
きゅうり	苗立枯病(リゾクテニア菌)	800倍	3L/m ²	は種直後	1回	灌注	1回

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマインを含む農薬の総使用回数
キャベツ	株腐病 黒腐病 軟腐病	800倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
はくさい	軟腐病	500倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
なす	青枯病			収穫前日まで	8回以内		8回以内
いちご	芽枯病 角斑細菌病	1000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
だいこん	軟腐病	500倍		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
たまねぎ	腐敗病 軟腐病			収穫3日前まで	5回以内		5回以内
レタス	すそ枯病 腐敗病 軟腐病	800倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
非結球レタス	すそ枯病 腐敗病 軟腐病			収穫14日前まで	4回以内		4回以内
しょうが	紋枯病			育苗期	1回		4回以内(育苗期は1回以内)
みつば	立枯病			移植後但し収穫21日後まで	3回以内		
にんにく	春腐病		収穫7日後まで	5回以内	5回以内		
ふき	白絹病		3L/m ²	収穫7日後まで	5回以内	灌注	5回以内(種茎浸漬は1回以内)
		—	植付時	1回	30分間種茎浸漬		
にら	葉腐病		100～300L/10a	刈揃え前まで	3回以内	散布	3回以内
てんさい	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	400倍	3～6L/m ²	育苗中期	1回	灌注	1回
だいず えだまめ	葉焼病	500倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
ねぎ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	400倍	6/m ²	は種時	1回	灌注	2回以内(は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計1回以内)
	軟腐病	500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで		散布	
	白絹病				株元散布		
西洋芝(ペントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	1000倍	1L/m ²	発病初期	8回以内	散布	8回以内
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	500倍	0.5～1L/m ²				

<注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951

深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122