

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル粒剤

登録番号:農林水産省登録 第20805号(登録会社:三井化学アグロ(株))
有効成分:ジノテフラン・・・1.0%
毒性:普通物(劇毒物に該当しないものを指している通称)
販売エリア:九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル粒剤』が平成24年12月19日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ハモグリバエ類」に使用時期「は種時」、使用方法「播溝土壌混和」を追加。
- ・作物名「ふき」の適用病害虫名「アブラムシ類」を追加。
- ・作物名「花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)」「きく」及び「ガーベラ」の使用時期「定植時」の本剤の使用回数を「4回以内」から「5回以内」に変更。
- ・作物名「花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)」「きく」及び「ガーベラ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内(定植後は4回以内)」から「5回以内(土壌混和は1回以内)」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

●変更後:変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ねぎ	アザミウマ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類					
	アザミウマ類	定植時	株元散布			
	ハモグリバエ類					
アザミウマ類	6~9kg/10a	生育期但し、収穫3日前まで	2回以内			
ふき	アブラムシ類	20kg/10a	定植後~生育期(草丈20cm頃まで但し、収穫45日前まで)	1回	土壌表面散布	3回以内 (粒剤は1回以内、水溶剤は2回以内)
きく	マメハモグリバエ	2g/株(但し10a当たり 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	コナジラミ類					
ガーベラ	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
	マメハモグリバエ	2g/株(但し10a当たり 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	
コナジラミ類						
花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
	コナジラミ類	1g/株(但し10a当たり30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	

<注意事項について>

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122