

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

登録番号: 農林水産省登録 第20889号 (登録会社: 住友化学(株))

有効成分: ベノミル・・・50.0%

毒性: 普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)

販売エリア: 熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ベンレート水和剤』が平成24年9月12日付けで下記の内容の適用が拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「麦類」を「麦類(小麦を除く)」に変更。
- ・作物名「小麦」の適用病害虫名「赤かび病」及び「雪腐病」を追加。
- ・作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)」の適用病害虫名「菌核病」を追加。
- ・作物名「えだまめ」に適用病害虫名「菌核病」及び「紫斑病」を追加。
- ・作物名「さやいんげん」及び「さやえんどう」の適用病害虫名「菌核病」を追加。
- ・作物名「豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)の適用病害虫名「菌核病」を追加し作物名「べにばないんげん」をこれに含める。
- ・作物名「いんげんまめ」の適用病害虫名「菌核病」の希釈倍数を「1000～1500倍」から「1000～2000倍」に変更。
- ・作物名「えんどうまめ」及び「だいず」に適用病害虫名「菌核病」を追加。
- ・作物名「だいず」の適用病害虫名「紫斑病」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫前日まで」に変更。
- ・作物名「非結球あぶらな科野菜類(みずな、チンゲンサイを除く)」「みずな」及び「チンゲンサイ」の適用病害虫名「炭疽病」を追加。
- ・作物名「さといも(葉茎)」の適用病害虫名「乾腐病」を追加。
- ・作物名「ゼラニウム」の適用病害虫名「黒根病」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】
【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベニミルを含む農薬の総使用回数
麦類 (小麦を除く)	雪腐病	2000~3000倍	60~150L	根雪前	1回	散布	1回
小麦	雪腐病 赤かび病			収穫7日前まで			4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	菌核病	2000倍	100~300L	収穫30日前まで	3回以内	散布	4回以内(種子粉衣は1回以内、散布は3回以内)
えだまめ	紫斑病			収穫開始14日前まで			
さやいんげん	菌核病						
さやえんどう	菌核病						
豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)	菌核病	1000~2000倍	100~300L	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内(種子粉衣は1回以内、散布は4回以内)
だいず	菌核病	1000~2000倍	100~300L	収穫前日まで	4回以内	散布	5回以内(種子粉衣は1回以内、散布は4回以内)
	紫斑病						
いんげんまめ	菌核病	1000~2000倍	100~300L	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(種子粉衣は1回以内、散布は4回以内)
	角斑病	1000~1500倍					
えんどうまめ	菌核病	1000~2000倍					
さといも (葉茎)	乾腐病	種いも重量の0.5%	—	催芽前	1回	種いも粉衣	1回
非結球あぶらな科野菜類(みずな、チンゲンサイを除く)	炭疽病	4000倍	100~300L	収穫21日前まで	1回	散布	2回以内(種子粉衣は1回以内、散布は1回以内)
みずな				収穫14日前まで			
チンゲンサイ				収穫7日前まで			
ゼラニウム	黒根病	2000倍	セルトレイ(60X30X3cm)1冊当り50ml	育苗期	2回以内	灌注	2回以内
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	2000~3000倍	2L/m ²	発病初期	6回以内	散布	6回以内

<注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
 深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122