

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル粒剤

登録番号: 農林水産省登録 第20805号(登録会社: 三井化学アグロ(株))

有効成分: ジノテフラン...1.0%

毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

販売エリア: 九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル粒剤』が平成24年4月26日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「コナジラミ類」の使用時期「育苗期」の使用量を「1g/株」から「1～2g/株」に変更。
- ・作物名「メロン」の適用病害虫名「コナジラミ類」の使用時期「育苗期」の使用量を「1g/株」から「1～2g/株」に変更。
- ・作物名「にがうり」の適用病害虫名「コナジラミ類」を追加。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「コナジラミ類」の使用時期「育苗期」の使用量を「1g/株」から「1～2g/株」に変更。
- ・作物名「ピーマン」に適用病害虫名「コナジラミ類」を使用時期「育苗期」、使用方法「株元散布」で追加。
- ・作物名「とうがらし類」に適用病害虫名「コナジラミ類」を使用時期「育苗期」、使用方法「株元散布」で追加。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「アザミウマ類」に使用時期「は種時」、使用方法「播溝土壌混和」を追加。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「アザミ馬類」及び「ハモグリバエ類」の使用方法「株元散布」に使用時期「生育期但し、収穫3日前まで」を追加。
- ・作物名「ねぎ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、散布は2回以内)」から「4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更。
- ・作物名「レタス」及び「非結球レタス」の適用病害虫名「ハモグリバエ」及び「アブラムシ類」を追加。
- ・作物名「だいこん」の適用病害虫名「キスジ/ミハムシ」に使用方法「全面土壌混和」及び「散布」を追加。
- ・作物名「だいこん」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」から「5回以内(は種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、は種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の粒剤の散布は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)」に変更。
- ・作物名「こまつな」「みずな」及び「非結球あぶらな科野菜類(こまつな、みずな、チンゲンサイを除く)」を統合し「非結球あぶらな科野菜類(チンゲンサイを除く)」とし、ジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」とする。
- ・作物名「なばな類」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「1回」から「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジネフランを含む農薬の総使用回数
きゅうり	コナジラミ類	1～2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
メロン						3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、散布は2回以内)
にがうり	コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
なす	コナジラミ類	1～2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
ピーマン	コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
とうがらし類						4回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
レタス	ナモグリバエ	培土1L当り15g	は種前	1回	培土混和	4回以内(は種前の培土混和は1回以内育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回、散布は2回)
	アブラムシ類 ナモグリバエ	1g/株	育苗期後半		株元散布	
非結球レタス	ナモグリバエ	培土1L当り15g	は種前		培土混和	
	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時		植穴土壌混和	
ねぎ	アザミウマ類	6kg/10a	は種時	2回以内	播溝土壌混和	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、育苗期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回)
	ハモグリバエ類		生育期但し収穫3日前まで		株元散布	
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	5回以内(は種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、は種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の粒剤散布は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)
	キシジミハムシ	4～6kg/10a			全面土壌混和	
		6kg/10a			生育期但し収穫30日前まで	
非結球あぶらな科野菜類(チンゲンサイ)	アブラムシ類 キシジミハムシ	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
なばな類	アブラムシ類					

＜注意事項について

注意事項については製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
 深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122