

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ水溶剤

クロチアニジン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 20798 号（登録会社：住友化学(株)）

有効成分：クロチアニジン・・・16.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ダントツ水溶剤」が平成27年5月19日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「未成熟とうもろこし」「豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）」「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイを除く）」「こまつな」「みつば」「しゅんぎく」「ほうれんそう」「パセリ」「セルリー」「あさつき」「わけぎ」「とうがらし類」「キウイフルーツ」「はくさい」および「かぶ」を追加する。
- ・作物名「うめ」の使用時期を「収穫3日前」から「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「チンゲンサイ」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫7日前まで」に変更し、クロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内（は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイを除く）」の追加に伴い、作物名「みずな」を削除する。
- ・作物名「つつじ類」および「げっきつ」の本剤の使用回数およびクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「6回以内」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

次ページの別紙に記載。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロアジンを含む農薬の総使用回数	
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く)				収穫7日前まで				4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
非結球あぶなら科葉菜類(こまつな、チンゲンサイを除く)				収穫3日前まで				
こまつな				収穫7日前まで				
チンゲンサイ	ハモグリバエ類	2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
みつば	アブラムシ類	2000～4000倍		収穫3日前まで	4回以内		4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	
しゅんぎく				収穫前日まで				
ほうれんそう				収穫14日前まで				1回
パセリ	ハモグリバエ類	2000倍		アブラムシ類	2000～4000倍		3回以内	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
セルリー	アブラムシ類	2000～4000倍						
わけぎ あさつき	ネギアザミウマ	2000～4000倍	200～700L /10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
とうがらし類	ネギハモグリバエ						アブラムシ類	コナジラミ類
	アブラムシ類							
キウイフルーツ	カメムシ類	2000～4000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内	
うめ	キウイヒメヨコバイ	2000～4000倍	200～700L /10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
	ケムシ類						2000倍	ケシキスイ類
	カメムシ類	2000倍		アオムシ				
	アブラムシ類						2000倍	2000倍
はくさい	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)		
	コナガ	2000倍						
	アオムシ	2000倍						
かぶ	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L /10a	発生初期	6回以内	6回以内		
つつじ類	ツツジゲンバイ	2000～4000倍	200L/樹	生育期	6回以内	樹幹塗布	6回以内	
げっきつ	ミカンキジラミ	40倍	200L/樹	生育期	6回以内	樹幹塗布	6回以内	

【使用上の注意事項の変更について】

製品に貼付してあるラベルを参照下さい。



本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮三丁目6-19	TEL:(0985)25-7051