

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ビクトリーZ1キロ粒剤

登録番号：農林水産省登録 第22843号(登録会社:協友アグリ(株))

有効成分：ピラクロニル・・・2.0%

プロピスルフロン・・・0.9%

毒性：普通物

販売エリア：宮崎県、鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ビクトリーZ1キロ粒剤』が平成23年7月20日付けで下記のように適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「オモダカ(北海道)」を「オモダカ(北陸・近畿・中国・四国を除く)」に変更。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「クログワイ(東北・関東・東山・東海、九州)」及び「コウキヤガラ(関東・東山・東海)」を追加。
- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「ヒルムシロ(北陸を除く)」を「ヒルムシロ」に変更。
- ・作物名「移植水稻」に使用時期「移植時」、使用方法「田植同時処理機で施用」、適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯」を追加。
- 作物名「移植水稻」の適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日～ノビE3葉期 但し、移植後30日まで」から「移植直後～ノビE3葉期 但し、移植 30日後まで」に変更。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「北海道」の適用土壌「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日～ノビE2.5葉期ただし、移植後30日まで」を「移植後5日～ノビE3葉期ただし、移植後30日まで」、使用土壌「砂壤土～埴土」、適用地帯「北海道、近畿・中国・四国、九州の普通期および早期栽培地帯」とする。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

#### 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	プロピスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く)	移植時	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	田植同時散布期で施用	東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内
	ヘラオモダカ(北海道、東北)	移植直後～ノビE3葉期 但し、移植後30日まで				湛水散布			
	ヒルムシロ								
	セリ	移植後5日～ノビE3葉期但し、移植後30日まで				北海道、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯			
	エゾノサヤカガサ(北海道)								
	オモダカ(北陸、近畿・中国・四国を除く)								
	クログワイ(東北、関東・東山・東海、九州)								
コウキヤガラ(関東・東山・東海)									
アオミドロ・藻類による表層はく離(北海道、東北を除く)									

#### ＜注意事項について＞

製品ラベルを参照下さい



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588  
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951