

サンケイ化学 農薬登録情報

ゼータワン1キロ粒剤

登録番号：農林水産省登録 第22834号(登録会社：住友化学株)
有効成分：プロピリスルフロンの0.9%
毒性：普通物
販売エリア：熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ゼータワン1キロ粒剤』が平成23年7月20日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「ヘラオモダカ(北海道)」を「ヘラオモダカ(北海道、東北)」に変更。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「エゾサヤヌカグサ(北海道)」「シズイ(東北)」「オモダカ」「クログワイ(北海道を除く)」及び「コウキヤガラ(北海道、北陸を除く)」を追加。
- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「セリ(九州を除く)」を「セリ」に変更。
- ・作物名「移植水稻」の適用時期「移植後5日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで」、適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」を、「移植後5日～ノビエ3葉期但し、移植後30日まで」「北海道、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで」から「移植後5日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで」に変更。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯」および「移植直後～ノビエ3葉期 但し、移植後30日後まで」「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯」に変更。
- ・作物名「移植水稻」に使用時期「移植時」、使用方法「田植同時散布期で施用」、適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プロピリスルフロンを 含む農薬の総 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く)	移植時	砂壤土～埴土	1kg/10a	2回以内	田植同時 散布期で 施用	東北、北 陸、関東・ 東山・東海 の普通期 及び早期 栽培地帯	2回以内
	ヘラオモダカ(北海道、東北)	移植直後～ノ ビエ3葉期 但 し、移植後30 日まで						
	ヒルムシロ セリ							
	エゾサヤヌカグサ(北海道)							
	シズイ(東北)	移植後5日～ ノビエ3葉期 但し、移植後 30日まで				湛水散布	北海道、 近畿・中 国・四国、 九州の普 通期及び 早期栽培 地帯	
	オモダカ							
	クログワイ(北海道を除く)							
	コウキヤガラ(北海道、北陸を除く)							

<注意事項について>

製品ラベルをご参照下さい



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951