

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

クロチアニジン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20800 号（登録会社：住友化学(株)）

有効成分：クロチアニジン・・・0.5%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ダントツ粒剤」が平成27年5月19日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「はくさい」「かぶ」「こまつな」「しゅんぎく」「ほうれんそう」「チンゲンサイ」を追加する。
- ・作物名「セルリー」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内（定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「げっきつ」の本剤の使用回数およびクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「6回以内」に変更する。
- ・作物名「さとうきび」に適用病害虫名「カンシャコバネナガカメムシ」、使用方法「株元処理土壌混和」を追加する。
- ・作物名「さとうきび」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「1回」から「4回以内（植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の使用量「6 kg/10a」に、使用時期「は種時」、使用方法「作条処理土壌混和」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロアキンを含む農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類	0.5g/株	育苗期後半	1回	株元処理	3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）
	コナガ					
	アオムシ					
	ハイマダラノメイガ					
	ネキリムシ類					
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴処理土壌混和	
	コナガ	2g/株				
	アオムシ	1～2g/株				
	ハイマダラノメイガ					
	アブラムシ類	0.25g/株			覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する	
ハイマダラノメイガ						
かぶ	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝処理土壌混和	4回以内 （は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）
こまつな						
しゅんぎく						
ほうれんそう						
チンゲンサイ			定植時			4回以内 （は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴処理土壌混和	4回以内 （は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）
げっきつ	ミカンキジラミ	30～40g/株	発生初期	6回以内	生育期株元処理	6回以内
さとうきび	ハリガネムシ類	4～6kg/10a	植付時	1回	植穴処理土壌混和	4回以内 （植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内）
	カンジャコバネナガカメムシ	6～9kg/10a	培土時	3回以内	株元処理土壌混和	
ねぎ	ネギアザミウマ	3～6kg/10a	収穫3日前まで	4回以内	株元処理	4回以内（定植時までの処理は1回以内）
	ネギハモグリバエ	6ka/10a	植付時	1回	植穴処理土壌混和	
			は種時		作条処理土壌混和	

【使用上の注意事項の変更について】

- ・「きゃべつ、はくさい、かぶ、こまつな、チンゲンサイに使用する場合は、薬害が生じる恐れがあるので使用量を厳守すること。」に変更する。
- ・「きゃべつ、はくさいのは種時に使用する場合は、薬害が生じる恐れがあるので覆土後に使用し、覆土前の使用はさけること。」に変更する。



サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮三丁目6-19	TEL:(0985)25-7051