

サンケイ化学 農薬登録情報

トクチオン乳剤

登録番号: 農林水産省登録 第13426号(登録: アリスタライフサイエンス(株))
有効成分: プロチオホス・・・45.0%
毒性: 普通物
販売エリア: 鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『トクチオン乳剤』が平成23年6月22日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「たまねぎ」の使用時期を「収穫30日前まで」から「収穫7日前まで」に、本剤の使用回数及びプロチオホスを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「4回以内」に変更。
- ・作物名「花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ペゴニア、宿根かすみそうを除く)」の適用病害虫名「アザミウマ類」を追加し、作物名「ガーベラ」及び「グラジオラス」を削除。
- ・作物名「ばら」「プリムラ」「シクラメン」及び宿根かすみそう」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加。
- ・作物名「きく」の適用病害虫名「ミカンキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更。
- ・作物名「芝」のプロチオホスを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「5回以内」に変更。
- ・作物名「庭木」を「樹木類(つばき類、さくら、プラタナスを除く)」に変更し、作物名「つばき類」「さくら」及び「プラタナス」に適用病害虫名「フラバーゾウムシ」を追加。
- ・適用表中に使用液量欄を設ける。
- ・作物名「みかん」「なし」「かき」「くり」「つばき類」「さくら」「プラタナス」及び「樹木類(つばき類、さくら、プラタナスを除く)」の使用液量を「200～700L/10a」とする。
- ・作物名「キャベツ」「にんにく」「ばれいしょ」「かんしょ」「あずき」「だいず」「てんさい」「しょうが」「いちご」「ばら」「きく」「プリムラ」「シクラメン」「ペゴニア」「宿根かすみそう」「花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、宿根かすみそうを除く)及び「たまねぎ」の希釈倍数「1000倍」の使用液量を「100～300L/10a」とする。
- ・作物名「茶」の使用液量を「200～400L/10a」とする。
- ・作物名「たまねぎ」の希釈倍数「300倍」の使用方法を「散布」とし、使用液量を「25L/10a」とする。
- ・作物名「さとうきび」の使用方法を「土壌灌注」とし、使用液量を「1.8L/m²」とする。
- ・作物名「芝」の使用方法を「散布」とし、使用液量を「0.5～1L/m²」とする。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチオホスを含む農薬の総使用回数	
みかん	コカクモンハマキ フジコカイガラムシ フラバゾウムシ	1000倍	200~700L /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	コカイガラムシ類 ハマキムシ類			収穫60日前まで	5回以内		5回以内	
かき	カキヘタムシガ フジコカイガラムシ マイマイガ アザミウマ類 ハマキムシ類			収穫75日前まで	2回以内		2回以内	
くり	モモコマダラメイガ ネスジキノカワガ			裂果前まで (但し収穫7日前まで)	5回以内		5回以内	
キャベツ	コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ ウワバ類 アブラムシ類	1000倍 300倍	100~300L /10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
たまねぎ	アザミウマ類			収穫7日前まで	4回以内		4回以内	
にんにく	ネギコガ	1000倍	100~300L /10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内 (植付時の土壌混和は1回以内)	
ばれいしょ	ジャガイモガ ヨトウムシ アブラムシ類			収穫21日前まで				3回以内
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ			収穫30日前まで				3回以内
あずき	フキノメイガ ツメクサガ			5回以内	3回以内		3回以内	
だいず	マメシンクイガ シロイモジマダラメイガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ツメクサガ							
てんさい	ヨトウムシ テンサイハモグリハナバエ テンサイビハムシ カメノコハムシ			5回以内	5回以内	5回以内		
茶	ハマキムシ類 チャノキアサミウマ カンザワハダニ			200~400L /10a	摘採21日前まで	1回	1回	
さとうきび	アオドウガネ ハリガネムシ類			1.8L/m ²	収穫90日前まで	2回以内	土壌灌注	2回以内(植付時の土壌混和は1回以内)
しょうが	アワノメイガ			100~300L /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
いちご	ハダニ類 キンケクチフトゾウムシ成虫				収穫75日前まで			3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロオホスを含む農薬の総使用回数		
花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く)	アザミウマ類	1000倍	100~300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内		
ばら	アブラムシ類 フラーバラゾウムシ			—					
	アザミウマ類								
きく	アブラムシ類 フラーバラゾウムシ			発生初期					
	アザミウマ類								
プリムラ	キンケクチフトゾウムシ成虫			—					
	アザミウマ類								
シクラメン	キンケクチフトゾウムシ成虫								
	アザミウマ類								
ベゴニア	キンケクチフトゾウムシ成虫								
	アザミウマ類								
つばき類	チャドクガ		200~700L/10a		—	3回以内	散布	3回以内	
	フラーバラゾウムシ								
さくら	アメリカシロヒトリ					4回以内		4回以内	
	フラーバラゾウムシ								
プラタナス	アメリカシロヒトリ	6回以内		6回以内					
	フラーバラゾウムシ								
宿根かすみそう	ヨトウムシ ナスハモグリバエ	100~300L/10a		—		6回以内		散布	6回以内
	アザミウマ類								
芝	シバツトガ	0.5~1L/m ²		発生初期		3回以内		散布	5回以内
たばこ	タバコアオムシ	25~180L/10a		収穫10日前まで		2回以内		散布	2回以内
	ヨトウムシ								
	アブラムシ類								
	ジャガイモガ アザミウマ類								
樹木類(つばき類、さくら、プラタナスを除く)	フラーバラゾウムシ	200~700L/10a	—	5回以内	散布	5回以内			

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951