

サンケイ化学 農薬登録情報

ベフラン液剤25

登録番号: 農林水産省登録 第21467号(登録: 日本曹達(株))
有効成分: イミノクタジン酢酸塩...25.0%
毒性: 劇物
販売エリア: 九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『ベフラン液剤25』が平成23年4月20日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「麦類(小麦を除く)及び「小麦」の希釈倍数「乾燥種子1kg当たり10倍希釈液30～50ml」を希釈倍数「10倍」使用液量「乾燥種子量1kg当たり30～50ml」に、希釈倍数「乾燥種子量1kg当たり5倍希釈液15～25ml」を希釈倍数「5倍」使用液量「乾燥種子1kg当たり15～25ml」に、希釈倍数「乾燥種子1kg当たり原液3～5ml」を希釈倍数「原液」使用液量「乾燥種子量1kg当たり3～5ml」とする。
- ・作物名「麦類(小麦を除く)」及び「小麦」に適用病害虫名「ふ枯病」を追加。
- ・作物名「麦類(小麦を除く)」及び「小麦」の使用量「散布」の使用液量「60～150L/10a」とする。
- ・作物名「りんご」「ぶどう」「日本なし」「西洋なし」「もも」「みかん」「かんきつ(みかん、ゆず除く)」「ゆず」「マルメロ」及び「かりん」の使用量「散布」の使用液量を「200～700L/10a」とする。
- ・作物名「アスパラガス」及び「りんどう」の使用液量を「100～300L/10a」とする。
- ・上記以外の使用液量を「一」とする。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
麦類(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	1000倍	60～150L/10a	根雪前	2回以内	散布	3回以内(種子への処理は1回以内、散布は2回以内)
	紅色雪腐病	10倍	乾燥種子1kg当たり30～50ml	は種前	1回	塗沫処理	
		5倍	乾燥種子1kg当たり15～25ml				
	条斑病 斑葉病 網斑病	原液	乾燥種子1kg当たり3～5ml			種子吹き付け 処理又は塗沫 処理	
	ふ枯病						
	斑葉病	250～500倍	-			10～30分間 種子浸漬	
	なまぐさ黒穂病	1000～2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノキサジンを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000倍	60～150L /10a	根雪前	3回以内 (但し出穂期以降は1回以内)	散布	4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)
	赤かび病	1000～2000倍		収穫14日前まで			
	紅色雪腐病	10倍	乾燥種子1kg当たり30～50ml	は種前	1回	塗沫処理	
		5倍	乾燥種子1kg当たり15～25ml				
	条葉病 ふ枯病	原液	乾燥種子1kg当たり3～5ml			種子吹き付け処理又は塗沫処理	
	なまぐさ黒穂病	1000～2000倍	-			10～30分間種子浸漬	
	りんご	モニリア病	1000倍	200～700L /10a	展葉期	6回以内 (但し、開花期以降散布は3回以内)	
腐らん病		500～1000倍	休眠期				
斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病		1500～2000倍	収穫前日まで				
黒星病		1500倍					
紫紋羽病		250倍	-	苗木植付前	-	根部浸漬	
ぶどう		晩腐病	250～500倍	200～700L /10a	休眠期	1回	散布
	褐斑病	250倍	収穫60日前まで		2回以内		
	黒とう病	1000倍	休眠期		1回		
	枝膨病						
日本なし 西洋なし	黒斑病	250倍				5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)	
もも	縮葉病	250～500倍				3回以内(休眠期は1回以内)	
みかん	貯蔵病害 (青かび病) (緑かび病)	2000～3000倍	200～700L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	貯蔵病害 (黒腐病) (白かび病)	2000倍					
かんきつ (みかん、ゆずを除く)	貯蔵病害 (青かび病) (緑かび病)	2000～3000倍			2回以内	散布	2回以内
	貯蔵病害 (黒腐病) (白かび病)	2000倍					
ゆず	貯蔵病害 (青かび病) (緑かび病)	2000～3000倍					
	貯蔵病害 (黒腐病) (白かび病)	2000倍					
	幹腐病						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを含む農薬の総使用回数
マルメロ	腐らん病	1500倍	200~700L /10a	展葉期	4回以内 (但し、開花期以降 散布は3回以内)	散布	4回以内(但し、開花期以降散布は3回以内)
かりん							
アスパラガス	茎枯病	1000倍	100~300L /10a	収穫終了後 (冬期まで)	5回以内		5回以内
りんどう	花腐菌核病 葉枯病	1500倍		-	8回以内		8回以内

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951