

# サンケイ化学 農薬登録情報

## スタウトダントツ箱粒剤

登録番号: 農林水産省登録 第22698号 (登録会社: 住友化学株)

有効成分: イソチアニル...2.0% クロチアニジン...1.5%

毒性: 普通物

販売エリア: 熊本県・宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタウトダントツ箱粒剤』が平成22年11月10日付けで下記のように適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「稲(箱育苗)」に適用病害虫名「白葉枯病」および「ニカメイチュウ」を追加する。
- ・作物名「稲(箱育苗)」の適用病害虫「フタオビコヤガ」の使用時期を「移植当日」から「は種時(覆土前)～移植当日」に変更する。
- ・作物名「稲(箱育苗)」に使用時期「は種前」の使用時期「育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する」を追加する。
- ・作物名「稲(箱育苗)」に適用病害虫「イネヒメハモグリバエ」を追加する。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

##### 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 イネズソウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマクドロコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土 壤約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土) ～移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する	4回以内 (移植時までの処理 は1回以内、 本田での散布、空 中散布、無人ヘリ散 布は合計3回以内)	3回以内 (移植時までの処 理は1回以内、本 田では2回以内)
	は種時		育苗箱の 床土又は 覆土に 均一に 混和する				
	移植3日前～ 移植当日		育苗箱の 上から 均一に 散布する				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951