

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ水溶剤

登録番号:農林水産省登録 第20798号 (登録会社:住友化学(株))

有効成分:クロチアニジン・・・16.0%

毒性:普通物

販売エリア:熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ダントツ水溶剤』が平成22年10月27日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「てんさい」の使用方法「苗床灌注」に適用病害虫名「アブラムシ類」を追加。
- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「ブドウトラカミキリ」を追加。
- ・作物名「かんきつ(苗木)」に適用病害虫名「アゲハ類」を追加。
- ・作物名「ブルーベリー」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数を「2000倍」から「2000～4000倍」に変更。
- ・作物名「にら(花茎)」の適用病害虫名「アブラムシ類」及び「ネギアザミウマ」を追加。
- ・作物名「はなっこりー」の適用病害虫名「アブラムシ類」を追加。
- ・作物名「オリーブ」の適用病害虫名「オリーブアナアキゾウムシ」を追加。

**【適用病害虫の範囲および使用方法
【変更後】 変更作物のみ**

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアジンを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|------|---|
| てんさい | テンサイピハムシ カメノコハムシ テンサイモグリハナハエ | 100～200倍 | 1L/ペーパーポット 1冊(3Lm ²) | 定植前 | 1回 | 苗床灌注 | 4回以内(定植前の 灌注は1回以内、散 布は3回以内) |
| | アブラムシ類 | | | | | | |
| | カメノコハムシ テンサイモグリハナハエ アブラムシ類 | 2000～400 0倍 | 100～300L /10a | 収穫14 日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| はなっこりー | アブラムシ類 | 2000倍 | 100～300L /10a | 収穫前日 まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(は種時の 土壌混和は1回以 内、散布は2回以 内) |
| にら(花茎) | アブラムシ類 ネギアザミウマ | 4000倍 | | | 3回以内 | | |
| オリーブ | オリーブアナアキゾウムシ | 2000倍 | 200～700L /10a | 2回以内 | | | |
| ぶどう | コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメコバイ | 2000～400 0倍 | 200～700L /10a | 収穫前日 まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | ブドウトラカミキリ | | | | | | |
| かんきつ (苗木) | ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ | 20倍 | 10～100ml/ 樹 | 春芽、夏 芽または 秋芽の発 生前 | 3回以内 | 樹幹散布 | 3回以内 |
| | アゲハ類 | | | | | | |
| ブルーベリー | アブラムシ類 | 2000～400 0倍 | 200～700L /10a | 収穫45 日前まで | | 散布 | |
| | ケムシ類 | 2000～400 0倍 | | | | | |

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951