

サンケイ化学 農薬登録情報

ダコニール1000

登録番号: 農林水産省登録 第21759号(住友化学株)・第16824号(クミアイ化学株)

有効成分: TPN・・・40.0%

毒性: 普通物

販売エリア: 熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ダコニール1000』が平成22年9月22日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「トマト」及び「ミニトマト」の使用方法「散布」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加。
- ・作物名「なす」の使用方法「散布」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加。
- ・作物名「アスパラガス」の使用方法「散布」に適用病害虫名「疫病」を追加。
- ・作物名「レタス」の使用方法「1㎡当たり希釈液3L土壌灌注」を「1㎡当たり希釈液1.5～3L土壌灌注」に変更。
- ・作物名「ねぎ」のTPNを含む農薬の総使用回数を「3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内)」から「4回以内(土壌灌注は1回以内、散布は3回以内)」に変更。
- ・作物名「ねぎ」の使用方法「散布」における本剤の使用回数を「2回以内」から「3回以内」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病	1000倍	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内(土壌 灌注は2回以 内)
	うどんこ病					
ミニトマト	疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
	うどんこ病					
なす	黒枯病 灰色かび病 すすかび病		収穫前日まで	4回以内		4回以内
	うどんこ病					
ねぎ	黒斑病 べと病 小菌核腐敗病 葉枯病		収穫14日前まで	3回以内		4回以内(土壌 灌注は1回以 内、散布は3回 以内)
	疫病					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
	疫病					
ねぎ	苗立枯病(リゾクトニア菌)	500倍	出芽揃い後(出芽3日後から10日後まで)	1回	1㎡当り希釈液0.5L土壌灌注	4回以内(土壌灌注は1回以内、散布は3回以内)
レタス	ビッグベイン病	1000倍	収穫42日前まで	2回以内	1㎡当り希釈液1.5~3L土壌灌注	5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内)

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951