

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル顆粒水溶剤

登録番号:農林水産省登録 第20811号(登録会社:三井化学アグロ株)
有効成分:ジノテフラン…20.0%
毒性:普通物
販売エリア:九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル顆粒水溶剤』が平成22年7月21日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「キスジノミハムシ」を希釈倍数「2000倍」で追加。
- ・作物名「ネクタリン」に適用病害虫名「モモチョッキリゾウムシ」を追加。
- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「ブドウトラカミキリ」を希釈倍数「2000倍」で追加。
- ・作物名「ぶどう」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「2回以内(塗布は1回以内)」に変更
- ・作物名「かんきつ(苗木)」の適用病害虫名「ミカンハモグリガ」を追加。
- ・作物名「かんきつ(みかんを除く)」及び「みかん」に適用病害虫名「サンホーゼカイガラムシ」を希釈倍数「2000倍」で追加。
- ・作物名「てんさい」に適用病害虫名「アブラムシ類」を使用「散布」希釈倍数「2000～3000倍」で追加。
- ・作物名「ぶどう」の適用病害虫名「コナカイガラムシ類」に使用方法「本剤1g当り水1mlの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更病害のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
はくさい	キスジノミハムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
ネクタリン	モモチョッキリゾウムシ		200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
ぶどう	ブドウトラカミキリ		2回以内	2回以内	2回以内(塗布は1回以内)		
かんきつ(みかんを除く)	サンホーゼカイガラムシ		3回以内	3回以内	3回以内		
みかん			3回以内	3回以内			
てんさい	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内)	
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	50倍	100ml/樹	育苗期	5回以内	株元灌注	5回以内
ぶどう	コナカイガラムシ類	(使用方法の項を参照)	20～40g/樹	幼果期まで 但し、収穫30日前まで	1回	本剤1g当り水1mlの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する	2回以内 (塗布は1回以内)

<注意事項について>(項目追加)

(5)かんきつの苗木に用いる場合は、今期に収穫見込みのない苗木に対して使用すること。なお、本剤を処理してから効果を発揮するまでにある程度の期間を要するため、対象害虫の発生苗に予防的に処理すること。

(以下、項目番号が一番ずつずれる。)



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951