

サンケイ化学 農薬登録情報

ソイリーン

登録番号: 農林水産省登録 第22163号(登録: 三井化学アグロ株)

有効成分: クロピクリン...40.0% 1,3-ジクロロプロペン...52.0%

毒性: 劇物

販売エリア: 熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ソイリーン』が平成22年6月23日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「いちご」のクロピクリンを含む農薬の総使用回数を「1回」から「2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)」に変更。
- ・適用雑草名「畑地一年生雑草」を「一年生雑草」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
いちご	炭疽病	30L /10a(1穴当たり3ml)	作付けの10~15日前	1回	耕起整地後、30cm間隔のフリ状に深さ約15cmに所定量を注入し直ちに覆土しポリエチレン、ビニール等で被覆する	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	1回
	萎黄病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L /10a(1穴当たり2~3ml)					
作物名	適用雑草	使用量	使用時期	使用回数	使用方法	クロピクリンを含む農薬の潮使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
すいか、キャベツ、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、いちご、ねぎ、セルリー、花き類・観葉植物	一年生雑草	20~30L /10a(1穴当たり2~3ml)	作付けの10~15日前	1回	耕起整地後、30cm間隔のフリ状に深さ約15cmに所定量を注入し直ちに覆土しポリエチレン、ビニール等で被覆する	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	1回
にんじん、ごぼう、メロン、だいこん、はくさい、なす、きゅうり、かぼちゃ、ほうれんそう、しょうが、ばれいしょ、かんしょ、さといも、やまのいも、こんにやく、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、オクラ、にがうり、葉しょうが						1回	

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951