

サンケイ化学 農薬登録情報

パダンSG水溶剤

登録番号: 農林水産省登録 第18950号(登録: 住友化学株)

有効成分: カルタップ・・・75.0%

毒性: 劇物

販売エリア: 熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『パダンSG水溶剤』が平成22年5月12日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「作物名「ほうれんそう」に適用病害虫名「アシロハモグリバエ」を追加。
- ・作物名「ふき(ふきのとう)」のカルタップを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「4回以内(水溶剤の処理は2回以内、粒剤の処理は2回以内)」に変更。
- ・適用表に使用量の欄を設け、作物名「稲」の使用量「散布」及び「はとむぎ」については「60～150/10a」、作物名「キャベツ」「はくさい」「だいこん」「なばな」「さやえんどう」「実えんどう」「ブロッコリー」「ほうれんそう」「チンゲンサイ」「レタス」「非結球レタス」「とうもろこし」「ばれいしょ」「ホップ」「しょうが」「ガーベラ」「シクラメン」「いぐさ」「ふき」「ふき(ふきのとう)」「くわい」「さやいんげん」「はつかだいこん」及び「飼料用とうもろこし」については「100～300L/10a」、作物名「かき」「くり」「びわ」「びわ(葉)」「ぶどう」及び「キウイフルーツ」については「200～700L/10a」、作物名「茶」については「200～400L/10a」を記載。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ	1500倍	60～150L /10a	収穫21日前まで	6回以内	散布	6回以内(種もみ浸漬は1回以内、床土への混和、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内)
	イネハモグリバエ	1500～3000倍					
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラメイガ	1500倍	100～300L /10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
はくさい	コナガ アオムシ アブラムシ類			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
だいこん	コナガ アオムシ アブラムシ類	1000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで		3回以内	
	ダイコンシンクイムシ						
なばな	コナガ アブラムシ類	1500倍	100～300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
さやえんどう	ウラナミジミ	1500～3000倍					
	ナモグリバエ						
実えんどう	ウラナミジミ	1500倍	100～300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ナモグリバエ	1500～3000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	コナガ	1500倍	100~300L /10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
ほうれんそう	ミナキイロアザミウマ				2回以内		2回以内
	アシクロハモグリバエ				3回以内		3回以内
チンゲンサイ	ハモグリバエ類 コナガ			収穫14日前まで			
レタス	ナモグリバエ ナメクジ類				1500倍		1500~3000倍
非結球レタス	ナモグリバエ ナメクジ類	4回以内	4回以内				
かき	チャノキイロアザミウマ カキホソガ イラガ カキマダラメイガ	1500倍	200~700L /10a	裂果前	3回以内		3回以内
	かきへたムシガ	1500倍			3回以内		3回以内
くり	モモノコマダラメイガ ネスジキカワガ	1500倍		200~700L /10a	春芽伸長期まで但し 収穫90日前まで	4回以内	4回以内
びわ	ナシヒメシキイ					5回以内	5回以内
びわ(葉)	チャノキイロアザミウマ フテンヒメコバイ				3回以内	3回以内	
ぶどう	キイロマイコガ キウイヒメコバイ		1回		1回		
茶	チャノホソガ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバイ	1000倍	100~300L /10a	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
とうもろこし	アワノメイガ	1500倍	60~150L /10a		2回以内	2回以内	
はとむぎ	ジャガイモガ若齢幼虫	1500倍	100~300L /10a	収穫7日前まで	6回以内	6回以内	
ばれいしょ	フキノメイガ				3回以内	3回以内	
ホップ	アワノメイガ				5回以内	5回以内	
しょうが	マメハモグリバエ			—	4回以内	4回以内	
ガーベラ	ミナキイロアザミウマ			発生初期	5回以内	5回以内	
シクラメン	イグサシムシガ			—	3回以内	3回以内	
いぐさ	アザミウマ類 アブラムシ類 フキノメイガ			収穫7日前まで	2回以内	2回以内	4回以内(水溶剤の 処理は2回以内、粒 剤の処理は2回以 内)
ふき	アザミウマ類 アブラムシ類 フキノメイガ						
ふき(ふきのと う)	アザミウマ類 アブラムシ類 フキノメイガ			収穫30日前まで 収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
くわい	ハスモンヨトウ						
さやいんげん	マメハモグリバエ			収穫7日前まで	1回	1回	
はつかだいこん	コナガ	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	2回以内		
飼料用とうもろ こし	アワノメイガ					1000倍	

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951