

# サンケイ化学 農薬登録情報

## センコル水和剤

登録番号:農林水産省登録 第14683号(登録:ハイエルクroppサイエンス(株))  
有効成分:トリフジン...50.0%  
毒性:普通物  
販売エリア:鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『センコル水和剤』が平成22年5月12日付けで下記のように適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「さとうきび(春植又は夏植)」の適用地帯を「九州・沖縄」から「全域」に変更。
- ・適用雑草名「畑地一年生雑草」を「一年生雑草」に変更。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

##### 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	使用回数	使用方法	適用地帯	トリフジンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	一年生雑草	植付直後～萌芽期まで	砂壤土～埴土	100g/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	北海道、東北	1回
アスパラガス		萌芽前～萌芽始期又は収穫打ち切り後(雑草発生前～4、5葉期)		100～150g/10a				全域	
トマト(露地栽培)		定植活着後～定植14日後まで(雑草発生前～2、3葉期まで)		60～100g/10a					
さとうきび(春植又は夏植)		ムラサキカタハミ		植付直後～植付45日後まで(雑草2葉期まで)			300g/10a	全面土壌散布	
	一年生雑草	植付直後～収穫30日前まで(雑草2葉期まで)		100～200g/10a			雑草茎葉散布		
	ムラサキカタハミ	同上		同上			同上	同上	
さとうきび(株出)	一年生雑草	萌芽45日後まで(雑草2葉期まで)	300g/10a	全面土壌散布	九州・沖縄				
	ムラサキカタハミ	同上	同上	同上					
	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草2葉期まで)	100～200g/10a	雑草茎葉散布					

#### <注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588  
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951