

サンケイ化学 農薬登録情報

サラブレッドRX フロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20948 号（登録会社：協友アグリ(株)）

有効成分：イマゾスルフロン・・・1.7%

オキサジクロメホン・・・1.2%

クロメプロップ・・・6.6%

ダイムロン・・・9.5%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「サラブレッドRXフロアブル」が平成27年8月26日付を以て下記の内容で適用拡大（登録内容変更）いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「移植水稻」の適用土壌、適用地帯を削除する
- ・作物名「直播水稻」の使用時期の「イネ」を「稲」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピラクロルを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数		
移植水稻	本田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ	移植時	500ml/10a	1回	田植同時 散布機で施用	2回以内	2回以内	2回以内	3回以内 (育苗箱散布は1回以内、 本田では2回以内)		
	ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ クログワイ アオミドロ・藻類による表層剥離									移植直後～ 7/12.5葉期 但し、 移植後30日まで	原液湛水散布 または 水口施用
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ									稲1.0葉期～ 7/12.5葉期 但し、 収穫90日前まで	原液湛水散布

【注意事項の変更について】

商品に貼付されているラベルを参照のこと



サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL:(099)268-7588
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮三丁目6-19番地	TEL:(0985)25-7051