

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

クロチアニジン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20800 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・0.50%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ダントツ粒剤」が平成 30 年 3 月 14 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「さとうきび」の使用時期「植付時」に適用病害虫名「メイチュウ類」、使用量「6kg/10a」を追加する。
- ・作物名「らっきょう」に適用病害虫名「ネダニ類」を追加する。
- ・作物名「れんこん」に使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ばら、きくを除く）」の使用量「1g/株」を「1～2g/株」に変更する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ばら、きくを除く）」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ばら、きくを除く）」を「花き類・観葉植物（きくを除く）」に変更し、それに伴い、作物名「ばら」を削除する。
- ・作物名「きく」の使用量「1g/株」を「1～2g/株」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
さとうきび	ハリガネムシ類	4～6kg/10a	植付時	1回	植溝処理土壌混和	4回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内)
	メイチュウ類	6kg/10a				
	カンシャコバナネナガカメムシ	6～9kg/10a	培土時	3回以内	株元処理土壌混和	
らっきょう	ネギアザミウマ	6kg/10a	収穫21日前まで	2回以内	株元散布	2回以内
	ネダニ類					
れんこん	クワイクビレアブラムシ	4～6kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	湛水散布 無人ヘリコプターによる散布	3回以内
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類	6kg/10a 1～2g/株	発生初期	4回以内	生育期株元散布	4回以内
	アザミウマ類	2g/株				
きく	アブラムシ類	6kg/10a 1～2g/株				
	マメハモグリバエ	2g/株				
	アザミウマ類					

【使用上の注意事項の変更について】

【変更前】

- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。

【変更後】

- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意を守ること。(追加)
 - 散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - 散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - 事前に本剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整すること。
 - 本剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該圃場周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整すること。
 - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように注意すること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。(変更)
 - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。

なお、使用上の注意事項については、製品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051