

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイダブルシューターSE

スピノサド・脂肪酸グリセリド水和剤

登録番号：農林水産省登録第 24054 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：スピノサド・・・・・・・・ 5.0%

脂肪酸グリセリド・・・・75.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：全国

新規登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイダブルシューターSE」が平成 30 年 3 月 14 日付で下記の内容にて新規登録いたしました。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数
なす	ハダニ類 コナジラミ類	1000倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	—	2回以内
トマト ミニトマト	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類							
ばら	ハダニ類			発生初期				

【使用上の注意事項の変更について】

〈効果・薬害等の注意〉

- 使用前に容器を良く振る（沈殿）。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- 散布の際は、葉裏等に散布むらを生じないように丁寧に散布する。
- キャプタン水和剤およびストロビルリン系薬剤との同時施用・近接散布はさける（薬害）
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

〈安全使用上の注意〉

- 皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんで良く洗い落とす（刺激性）
- 散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、衣服を換える。
- 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。
- かぶれやすい人は取り扱いに十分注意。
- 蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園があるところでは使用しない。

●ミツバチに対する注意

○巣箱およびその周辺にかからないようにする。

○ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。

○関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合には、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。



サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島四丁目5-1 新栄ビル	TEL:(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)572-4171
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮 崎 事 務 所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051