

# サンケイ化学 農薬登録情報

## クミアイダコニール 1000

TPN 水和剤

登録番号：農林水産省登録第 16824 号（登録会社：クミアイ化学工業株式会社）

有効成分：TPN・・・40.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ダコニール 1000」が平成 30 年 6 月 13 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「あしたば」、適用病害虫名「黒枯病」を追加する。
- ・作物名「いちじく」に適用病害虫名「さび病」を追加する。
- ・作物名「レタス」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ばらを除く）」、「ばら」、「ゆり」に適用病害虫名「斑点病」を追加し、作物名「きく」に適用病害虫名「白さび病」、「斑点病」、「うどんこ病」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

次ページに記載します。

#### 【注意事項の変更について】

今回の適用拡大にともなう注意事項の変更等はありません。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



## サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数	
あしたば	黒枯病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	
いちじく	疫病 黒葉枯病 黒かび病	2000倍	200～ 700L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内	
	さび病							
レタス	灰色かび病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		5回以内 (土壌灌注は2回以内、 散布は3回以内)	
	すそ枯病 べと病							
きく	黒斑病 褐斑病			白さび病 うどんこ病 斑点病	—		6回以内	6回以内
	黒星病 うどんこ病							
ばら	うどんこ病			斑点病	—		6回以内	6回以内
	葉枯病 斑点病							
ゆり	葉枯病 斑点病				—		6回以内	6回以内
	うどんこ病							
花き類・観葉植物(ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く)	うどんこ病				—	6回以内	6回以内	
	斑点病							