

サンケイ化学 農薬登録情報

STジベラ錠

ジベレリン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第21318号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ジベレリン・・・3.58%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「STジベラ錠」が平成31年1月22日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「セルリー」の使用濃度、使用液量、使用時期を変更する。
- ・作物名「ばれいしょ」を追加する。
- ・作物名「種いも用ばれいしょ」に使用方法「種いも散布」を追加する。
- ・作物名「種いも用ばれいしょ」の使用目的「全粒種いもの増収」を「休眠打破による萌芽促進及び全粒種いもの増収」に変更する。

【適用病害虫名及び使用方法】

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
セルリー	生育促進 肥大促進	ジベレリン 50～100ppm	20～200L/10a	収穫予定 7～20日前	1回	葉面散布	2回以内 (種子への処理は1回以内、 は種後は1回以内)
ばれいしょ	休眠打破による萌芽促進 及び小粒いもの増収	ジベレリン 5～10ppm	—	植付前	1回	30秒間種いも浸漬	1回
種いも用 ばれいしょ	休眠打破による萌芽促進 及び全粒種いもの増収		250～300mL /種いも10kg			種いも散布	
			—			30秒間種いも浸漬	
			250～300mL /種いも10kg			種いも散布	

【使用上の注意事項等の変更】

- ・セルリー
定植後約1ヶ月以内に散布すると「す」が入りやすくなるので使用をさけること。
なお、スポット散布で使用する場合は1株あたりの使用液量が5～10mLが適量である。

【使用上の注意事項等の追加】

- ・ばれいしょ

- 種いも切断後の処理は薬害を生じるおそれがあるので、必ず種いもを切断せずに処理する。
- 浸漬時間が長くなったり、高濃度液に浸漬すると薬害を生じるおそれがあるので所定の浸漬時間及び使用濃度を厳守する。
- 薬剤処理した種いもは長時間ぬれたままにしておくと発芽遅延等の薬害を生じるので、風通しのよい場所ですみやかに乾燥させる。
- 種いもを切断する場合は処理した薬液が十分乾いてから行う。
- 品種により本剤に対する感受性が異なるので、下記に記載する品種以外に対して本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるか、自ら事前に薬効及び薬害を確認した上で使用すること。

「ホッカイコガネ、男爵薯、トヨシロ、十勝こがね」

【安全使用上の注意事項の追加】

- 使用の際は農業用マスクなどを着用すること。作業後はうがいをする。
- 浸漬処理に使用する際は不浸透性手袋などを着用すること。

なお、使用の際には商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051