

サンケイ化学 農薬登録情報

ベルコート水和剤

イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤

登録番号：農林水産省登録第 18821 号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジンアルベシル酸塩・・・・・・・・・・40.0%

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベルコート水和剤」が平成 30 年 10 月 10 日付で下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「だいず」、「豆类（種実、ただし、だいずを除く）」、「ばれいしょ」、「やまのいも」、「てんさい」、「キャベツ」、「レタス」、「たまねぎ」、「にんにく」、「にんじん」、「トマト」、「ミニトマト」、「なす」、「きゅうり」、「かぼちゃ」、「ズッキーニ」、「すいか」、「メロン」、「うり類（漬物用）」及び「いちご」の使用
方法「散布」について使用液量を「100～300L/10a」に変更する。
- ・作物名「アスパラガス」の使用液量を「100～500L/10a」に変更する。
- ・作物名「にんじん」、「やまのいも」及び「小麦」のイミノクタジンを含む農薬の総使用回数を次の通り変更する。

にんじん：5回以内（種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内）

やまのいも：5回以内（種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内）

小麦：4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内）

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大部分のみ）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等について】

使用の際は商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大部分のみ）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノクチンを含む農薬の総使用回数	
すいか	うどんこ病 つる枯病 菌核病 炭疽病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内	
メロン	うどんこ病 つる枯病	1000倍			5回以内		5回以内	
かぼちゃ	うどんこ病	1000～2000倍		収穫7日 前まで	4回以内		4回以内	
ズッキーニ		2000倍		収穫前日 まで	7回以内		7回以内	
きゅうり	褐斑病	2000倍						
	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	2000～4000倍						
うり類(漬物用)	うどんこ病 つる枯病 炭疽病	2000～4000倍		収穫3日 前まで	5回以内		5回以内	
なす	すすかび病 灰色かび病 うどんこ病	3000倍		収穫前日 まで	3回以内		3回以内	
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000倍			5回以内		5回以内	
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	1000倍		100～ 500L/10a	収穫7日 前まで		5回以内	5回以内
にんにく	葉枯病	1000～1500倍	100～ 300L/10a	収穫3日 前まで	3回以内	3回以内		
にんじん	菌核病	1000倍		収穫14日 前まで	5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回 以内、無人航空機 散布は2回以内)		
	黒葉枯病	500～1000倍		—	乾燥種子重量の 0.5%		は種前	1回
トマト	葉かび病	3000～6000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
ミニトマト	灰色かび病	6000倍			2回以内		2回以内	
レタス	灰色かび病 菌核病	1000～2000倍		収穫30日 前まで	3回以内		3回以内	
キャベツ	菌核病	1000倍		収穫28日 前まで				
いちご	炭疽病	1000倍		育苗期(定 植前)	5回以内		10回以内(育苗 期は5回以内、本 圃では5回以内)	
	うどんこ病	1000倍 4000倍						収穫前日 まで(生育期)
豆類(種実、た だし、大豆を除く)	うどんこ病 炭疽病 褐斑病	1000倍		収穫7日 前まで	3回以内		3回以内	
だいず	紫斑病	1000倍		乾燥種子重量の 0.5%	は種前		4回以内	4回以内(種子粉 衣は1回以内)
ばれいしょ	夏疫病	500倍					1回	
やまのいも	葉渋病	1000～2000倍		100～ 300L/10a	収穫7日 前まで		5回以内	散布
	青かび病	—	種いも重量の1%	植付前	1回	種いも粉衣		
てんさい	斑点病 褐斑病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫14日 前まで	4回以内	散布	4回以内	
小麦	赤かび病	1000～2000倍	60～180L/10a	収穫21日 前まで	3回以内 (出穂期以 降は1回以 内)	散布	4回以内 (種子への処理は 1回以内、散布及 び無人航空機散布 は合計3回以内、 出穂期以降は1回 以内)	